

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

г.Бишкек, от 31 июля 2024 года № 432

Об утверждении национальных перечней жизненно важных лекарственных средств и медицинских изделий

В соответствии со статьей 8 Закона Кыргызской Республики "Об обращении лекарственных средств", статьей 8 Закона Кыргызской Республики "Об обращении медицинских изделий", статьями 13, 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Кабинете Министров Кыргызской Республики" Кабинет Министров Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить:

- Национальный перечень жизненно важных лекарственных средств согласно приложению 1;
- Национальный перечень жизненно важных медицинских изделий согласно приложению 2.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении национальных перечней жизненно важных лекарственных средств и медицинских изделий" от 6 июня 2018 года № 274.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

Опубликован в газете "Эркин Тоо" от 6 августа 2024 года N 59

**Председатель Кабинета
Министров Кыргызской
Республики**

А.Жапаров

Приложение 1

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ жизненно важных лекарственных средств

Национальный перечень жизненно важных лекарственных средств (далее - Перечень) составлен на основе Модельного списка основных лекарственных средств Всемирной организации здравоохранения № 23, принятого 26 июля 2023 года.

В настоящем Перечне используются следующие условные обозначения:

□ - означает, что лекарственное средство, включенное в настоящий Перечень, является примером лучших доказательств эффективности и безопасности, но могут применяться лекарственные средства этой же группы по наиболее доступной цене;

[a] - означает противопоказания к применению лекарственного средства в зависимости от возраста и веса пациента;

[c] - означает, что применение лекарственного средства требует специализированного диагностического/мониторингового оборудования и/или врача узкой специальности; указание символа в дозировке означает, что есть определенные противопоказания к применению у детей;

* - означает особые показания к применению или то, что лекарственное средство включено в клинические руководства/протоколы, утвержденные уполномоченным государственным органом Кыргызской Республики в области здравоохранения, или особые указания при использовании данного средства;

** - означает, что лекарственное средство относится к психотропным средствам, подлежащим контролю в Кыргызской Республике, отпускается строго по рецепту соответствующего образца и подлежит предметно-количественному учету;

*** - означает, что лекарственное средство относится к наркотическим средствам, подлежащим контролю в Кыргызской Республике, отпускается строго по рецепту соответствующего образца и подлежит предметно-количественному учету;

± - означает, что лекарственное средство включено в настоящий Перечень только для улучшения его физической доступности для пациентов и относится к категории дорогостоящих (высокозатратных) препаратов;

[г] - означает, что лекарственное средство относится к противомикробным средствам, требующим рецептурного отпуска.

В настоящем Перечне противомикробные средства разделены на группу широкого доступа, группу наблюдения и группу резерва (см. ниже в строке таблицы перед данным разделом представлено объяснение).

Примечание: кроме указанных в данном Перечне дозировок и лекарственных форм, могут использоваться другие дозировки и лекарственные формы в зависимости от профиля и тяжести заболевания, индивидуальных особенностей пациента, профиля организаций здравоохранения, неотложных и чрезвычайных условий.

№	Международное непатентованное наименование лекарственных средств (МНН)		Лекарственная форма, доза
1. Анестетики, препараты для предоперационной подготовки и медицинские газы			
1.1. Общие анестетики и кислород			
1.1.1. Ингаляционные анестетики			
1	Галотан	Halotane	Ингаляция
2	Изофлуран	Isoflurane	Ингаляция
3	Оксид азота	Nitrous oxide	Ингаляция
4	Кислород	Oxygen	Ингаляция (медицинский газ)
5	Севофлуран	Sevoflurane	Ингаляция
1.1.2. Инъекционные лекарственные средства			
6	Кетамин	Ketaminum	Раствор для инъекций: 50 мг/мл, 10 мг/мл (в виде гидрохлорида); 10% раствор во флаконах по 10 мл
7	Пропофол*	Propopholum	Раствор для инъекций: 10 мг/мл; 20 мг/мл *альтернатива - тиопентал натрия (может быть использован в зависимости от физического наличия и стоимости)
1.2. Местные анестетики			
8	Бупивакаин	Bupivacaine	Раствор для инъекций: 0,25%; 0,5% (в виде гидрохлорида).

			Раствор для инъекций для спинномозговой анестезии: 0,5% в 4 мл ампуле для смешивания с 7,5% раствором глюкозы (в виде гидрохлорида)
9	Прокаин*	Procainum	Раствор для инъекций: 0,25%, 0,5%, 1%, 2%; Мазь: 5%, 10%; Суппозитории: 100 мг *как местный анестетик короткого действия
10	☐ Лидокаин	Lidocainum	Раствор для инъекций: 1%; 2% (в виде гидрохлорида) Раствор для спинномозговой анестезии: 5% в 2 мл ампуле (в виде гидрохлорида) для смешивания с 7,5% раствором глюкозы. Для местного применения: 2% до 4% (в виде гидрохлорида)
11	Лидокаин + эпинефрин (адреналин)	Lidocaine + epinephrine (adrenaline)	Стоматологические картриджи: 2% лидокаина (в виде гидрохлорида) + эпинефрин 1:80000 Раствор для инъекций: 1%, 2% лидокаина (в виде гидрохлорида или сульфата) + эпинефрин 1:200000
12	Эфедрин*	Ephedrine	Раствор для инъекций: 30 мг/мл (в виде гидрохлорида) *для использования при спинальной анестезии при родах, профилактики гипотензии
1.3. Лекарственные средства для предоперационной терапии и кратковременных процедур			
13	Атропин	Atropinum	Раствор для инъекций: 1 мг/1 мл (в виде сульфата)

14	***Морфин	Morphinum	Раствор для инъекций: 10 мг/1 мл (в виде сульфата или гидрохлорида)
15	☐ **Мидазолам	Midazolamum	Раствор для инъекций: 1 мг/мл Пероральный раствор: 2 мг/мл [с] Таблетки: 7,5 мг, 15 мг
1.4. Медицинские газы			
16	Кислород*	Oxygen	Ингаляции *использование при ведении гипоксемии
2. Лекарственные средства от боли и препараты для паллиативной помощи			
2.1. Неопиодные и нестероидные противовоспалительные лекарственные средства (НПВС)			
17	Ацетилсалициловая кислота	Acetylsalicylic acidum	Таблетки: 100 мг до 500 мг Суппозитории ректальные: 50 мг до 150 мг
18	Ибупрофен [а]	Ibuprofenum	Пероральный раствор: 100 мг/5 мл; 200 мг/5 мл Таблетки: 200 мг; 400 мг; 600 мг [а] не использовать у детей младше 3 месяцев
19	Парацетамол*	Paracetamolium	Пероральный раствор: 120 мг/5 мл; 125 мг/5 мл; 250 мг/5 мл [с] Суппозитории ректальные: 100 мг, 250 мг [с] Таблетки: 250 мг, 325 мг, 500 мг Таблетки диспергируемые: 100 мг, 250 мг Раствор для инфузий: 10 мг/мл *не рекомендуется для противовоспалительн ого применения из-за отсутствия доказанной эффективности такого применения
20	Диклофенак*	Diclofenacum	Таблетки: 25 мг, 50 мг,

			75 мг, 150 мг Суппозитории ректальные: 25 мг, 50 мг, 100 мг Раствор для инъекций: 1 мл раствора содержит диклофенак натрия 25 мг, 1 ампула (3 мл) - 75 мг *включен в клинические протоколы по лечению хронической боли в качестве 1 ступени лечения боли
2.2. Опиоидные анальгетики			
21	☐ ***Морфин	Morphinum	Гранулы (с медленным высвобождением; смешать с водой): 20 мг до 200 мг (в виде сульфата) Раствор для инъекций: 10 мг/1 мл (в виде гидрохлорида или сульфата) Пероральный раствор: 10 мг/5 мл (в виде гидрохлорида или сульфата) Таблетки (медленное высвобождение): 10 мг до 200 мг (в виде гидрохлорида или сульфата) Таблетки (немедленное освобождение): 10 мг (в виде сульфата)
22	***Фентанил*	Fentanylum	Раствор для инъекций: 50 мкг/мл; Трансдермальная терапевтическая система (ТТС): 25 мкг/ч, 50 мкг/ч, 75 мкг/ч, 100 мкг/ч *для лечения хронической боли
23	***Трамадол*	Tramadolum	Твердая пероральная лекарственная форма: 50 мг

			Таблетки ретард: 100 мг, 200 мг Капли во флаконах: 5%, 10% раствор Суппозитории ректальные: 100 мг *согласно клиническому протоколу по боли
24	***Кодеин	Codeinum	Таблетки: 30 мг (в виде фосфата)
25	***Метадон*	Methadonum	Таблетки: 5 мг, 10 мг (в виде гидрохлорида) Пероральный раствор: 5 мг/5 мл, 10 мг/5 мл (в виде гидрохлорида) Концентрат для перорального раствора: 5 мг/5 мл, 10 мг/5 мл (в виде гидрохлорида) *для лечения боли, связанной с онкологическим заболеванием
26	***Тримеперидин*	Trimeperidine	Раствор для инъекций: 1% или 2% *согласно клиническому протоколу по боли
2.3. Лекарственные средства, применяемые при других распространенных симптомах в паллиативной помощи			
27	**Амитриптилин	Amitriptylinum	Таблетки: 10 мг; 25 мг; 75 мг
28	Дексаметазон	Dexamethasonum	Раствор для инъекций: 4 мг/мл в 1 мл ампуле (в виде соли динатрия фосфата) Пероральный раствор: 2 мг/5 мл Таблетки: 2 мг [с]; 4 мг
29	**Диазепам	Diazepamum	Раствор для инъекций: 5 мг/мл Пероральный раствор: 2 мг/5 мл Ректальный раствор: 2 мг/мл в 1,25 мл; 2,5 мл ректального туба; 4 мг/мл в 2,5 мл

			ректального туба Таблетки: 5 мг; 10 мг
30	**Флуоксетин [а]	Fluoxetinum	Твердая пероральная лекарственная форма: 20 мг (в виде гидрохлорида) [а] не использовать у детей до 8 лет
31	Гиосцина бутилбромид* [с]	Hyoscines butylbromidum	Раствор для инъекций: 20 мг/мл *при спазмах ЖКТ и синдроме раздраженного кишечника
32	Лактулоза [с]	Lactulosa	Пероральный раствор: 3,1-3,7 г/5 мл
33	Сенна	Senna	Пероральный раствор: 7,5 мг/5 мл
34	Лоперамид	Loperamidum	Твердая пероральная лекарственная форма: 2 мг
35	Метоклопрамид	Metoclopramidum	Раствор для инъекций: 5 мг/мл (в виде гидрохлорида) Пероральный раствор: 5 мг/5 мл Твердая пероральная лекарственная форма: 10 мг (в виде гидрохлорида)
36	□ Ондансетрон [а]	Ondansetronum	Раствор для инъекций: 2 мг/мл (в виде гидрохлорида) Пероральный раствор: 4 мг/5 мл Твердая пероральная лекарственная форма: экв. 4 мг основы; экв. 8 мг основы [а] не использовать у детей в возрасте до 1 месяца
37	**Мидазолам	Midazolamum	Раствор для инъекций: 1 мг/мл Пероральный раствор: 2 мг/мл [с] Таблетки: 7,5 мг, 15 мг
38	Циклизин [с]	Cyclizinum	Раствор для инъекций: 50 мг/мл

			Таблетки: 50 мг
39	Докузат натрия	Docusate sodium	Капсулы: 100 мг Пероральный раствор: 50 мг/5 мл
40	**Галоперидол	Haloperidolum	Раствор для инъекций: 5 мг/мл Пероральный раствор: 2 мг/мл Твердая пероральная лекарственная форма: 0,5 мг, 2 мг, 5 мг
41	Гиосцина гидробромид* [с]	Hyoscines hydrobromidum	Раствор для инъекций: 400 мкг/мл; 600 мкг/мл Трансдермальный пластырь: 1 мг/72 часа *при рвоте и тошноте, гиперсаливации
3. Лекарственные средства для применения при аллергических реакциях и анафилаксии			
42	Дексаметазон	Dexamethasonum	Раствор для инъекций: 4 мг/мл (в виде соли динатрия фосфата)
43	Эпинефрин	Epinephrinum	Раствор для инъекций: 1 мг/1 мл (в виде гидрохлорида или гидроген тартрата)
44	Гидрокортизон	Hydrocortisonum	Порошок для инъекций: 100 мг (в виде натрия сукцината)
45	☐ Лоратадин*	Loratadinum	Пероральный раствор: 1 мг/мл Таблетки: 10 мг *альтернатива - цетиризин, фексафенадин
46	Хлоропирамин*	Chloropyramine	Раствор для инъекций: 20 мг/мл *при лечении анафилактических и аллергических реакций
47	☐ Преднизолон	Prednisolonum	Пероральный раствор: 5 мг/мл [с] Таблетки: 5 мг; 25 мг
4. Антидоты и другие лекарственные средства, применяемые при отравлениях			
4.1. Неспецифические лекарственные средства			
48	Уголь активированный	Activated charcoal	Таблетки, порошок
4.2. Специфические лекарственные средства			

49	Атропин	Atropinum	Раствор для инъекций: 1 мг/1 мл (в виде сульфата)
50	Ацетилцистеин	Acetylcysteinum	Раствор для инъекций: 200 мг/мл
51	Кальция глюконат	Calcium gluconate	Раствор для инъекций: 100 мг/мл
52	***Налоксон	Naloxonum	Раствор для инъекций: 400 мкг/1 мл (в виде гидрохлорида)
53	Метилтиониния хлорид (метиленовая синь)	Methylthioninium chloride	Раствор для инъекций: 10 мг/мл
54	Пеницилламин	Penicillaminum	Твердая пероральная лекарственная форма: 250 мг
55	Калия гексацианоферрат железа (II) - 2H ₂ O (Берлинский голубой)	Potassium ferric hexacyano- ferrate (II) - 2H ₂ O	Порошок для перорального применения
56	Натрия нитрит	Sodium nitrite	Раствор для инъекций: 30 мг/мл
57	Натрия тиосульфат	Sodium thiosulfate	Раствор для инъекций: 250 мг/мл
58	Дефероксамин	Deferoxaminum	Порошок для инъекций: 500 мг (в виде мезилата)
59	Димекапрол	Dimercaprolum	Масло для инъекций: 50 мг/мл
60	Натрий кальция эдетат	Sodium calcium edetate	Раствор для инъекций: 200 мг/мл
61	Сукцимер	Succimer	Твердая пероральная лекарственная форма: 100 мг
62	Фомепизол	Fomepizolum	Раствор для инъекций: 5 мг/мл (в виде сульфата) или 1 г/мл (в виде основы)
5. Лекарственные средства для заболеваний нервной системы			
5.1. Противосудорожные лекарственные средства			
63	**Карбамазепин	Carbamazepinum	Пероральный раствор: 100 мг/5 мл Таблетки жевательные: 100 мг; 200 мг Таблетки делимые: 100 мг; 200 мг, 400 мг
64	**Диазепам	Diazepamum	Ректальный гель: 5 мг/мл Ректальный раствор: 5

			мг/мл
65	Магния сульфат*	Magnesium sulfate	Раствор для инъекций: 0,5 г/мл в 2 мл ампулы (эквивалентен 1 г в 2 мл, 50% масса/объем); 0,5 г/мл в 10 мл ампулы (эквивалентен 5 г в 10 мл; 50% масса/объем) *для применения при эклампсии и тяжелой преэклампсии, а не при других видах судорожного расстройства
66	**Фенобарбитал	Phenobarbitalum	Раствор для инъекций: 30 мг/мл или 60 мг/мл [с]; 200 мг/мл (в виде натриевой соли) Пероральный раствор: 15 мг/5 мл Таблетки: 15 мг - 100 мг
67	**Вальпроевая кислота*	Valproic acid	Пероральный раствор: 200 мг/5 мл Таблетки делимые: 100 мг Таблетки кишечнорастворимые: 200 мг; 500 мг Раствор для инъекций: 100 мг/мл *Избегать применения при беременности, а также у женщин и девочек репродуктивного возраста, за исключением случаев, когда альтернативные методы лечения неэффективны или не переносятся из-за высокого риска развития врожденных дефектов и внутриутробных нарушений развития у детей под воздействием вальпроата

68	**Ламотриджин*	Lamotriginum	Таблетки: 5 мг, 25 мг, 50 мг, 100 мг *альтернативное средство при лечении резистентных форм генерализованных судорог
69	**Леветирацетам	Levetiracetam	Пероральный раствор: 100 мг/мл Таблетки: 250 мг, 500 мг, 750 мг, 1000 мг Концентрированный раствор для инфузий: 500 мг/5 мл Раствор для инъекций: 5 мг/мл, 10 мг/мл, 15 мг/мл в 100 мл
70	** □ Лоразепам	Lorazepam	Раствор для инъекций: 2 мг/мл; 4 мг/мл
71	**Мидазолам	Midazolam	Сублингвальный раствор: 5 мг/мл Раствор для инъекций: 1 мг/мл; 5 мг/мл
72	**Фенитоин	Phenytoin	Раствор для инъекций: 50 мг/мл (в виде фенитоина натрия) Пероральный раствор: 30 мг/5 мл Твердая пероральная лекарственная форма: 25 мг, 50 мг, 100 мг (фенитоина натрий)
73	**Этосуксемид	Ethosuxemidum	Капсулы: 250 мг Пероральный раствор: 250 мг/5 мл
5.2. Лекарственные средства для рассеянного склероза			
74	Глатирамера ацетат	Glatiramerum acetate	Раствор для подкожных инъекций: 20 мг/мл, 40 мг/мл
75	Ритуксимаб	Rituximab	Раствор для внутривенных инъекций: 500 мг/50 мл
76	Мемантин*	Memantinum	Таблетки: 5 мг, 10 мг, 15 мг, 20 мг *применяется для лечения деменции
5.3. Лекарственные средства для паркинсонизма			
77	**Леводопы + Карбидопы	Carbidopa + Levodopa	Таблетки: 100 мг + 10

			мг; 100 мг + 25 мг; 250 мг + 25 мг
78	**Тригексифенидил	Trihexyphenidylum	Таблетки: 1 мг, 2 мг, 5 мг
79	Селегилин	Selegilinum	Таблетки: 5 мг
6. Противомикробные лекарственные средства			
6.1. Противогельминтные средства			
6.1.1. Кишечные противогельминтные средства			
80	Альбендазол	Albendazolum	Твердая пероральная лекарственная форма: 200 мг, 400 мг Суспензия для приема внутрь: 400 мг/10 мл
81	Левамизол	Levamisolum	Таблетки: 50 мг; 150 мг (в виде гидрохлорида)
82	Мебендазол	Mebendazolum	Твердая пероральная лекарственная форма: 100 мг; 500 мг Суспензия для приема внутрь: 100 мг/5 мл
83	Празиквантел	Praziquantelum	Таблетки: 150 мг; 500 мг Таблетки делимые: 600 мг
84	Пирантел	Pyrantelum	Таблетки жевательные: 250 мг (в виде эмбоната или памоата)
85	Ивермектин	Ivermectinum	Таблетки: 3 мг
86	Никлозамид	Niclosamidum	Таблетки жевательные: 500 мг
6.2. Антибактериальные средства			
Для содействия рациональному использованию антибиотиков на национальном уровне и снижения антимикробной резистентности антибиотики представлены согласно классификации Access, Watch, Reserve (AWaRe), в которой антибиотики классифицируются по различным группам, чтобы подчеркнуть важность их надлежащего использования. Группа Access - АНТИБИОТИКИ ШИРОКОГО ДОСТУПА В эту группу входят антибиотики, обладающие активностью в отношении широкого спектра часто встречающихся чувствительных патогенов и при этом обладающие меньшим потенциалом резистентности, чем антибиотики других групп. Антибиотики группы Access рекомендованы в качестве основных эмпирических препаратов первого или второго выбора для лечения распространенных инфекций. Группа Watch - АНТИБИОТИКИ ГРУППЫ НАБЛЮДЕНИЯ В эту группу входят антибиотики с более высоким потенциалом резистентности, включающие большинство наиболее приоритетных препаратов из списка критически важных антимикробных препаратов. Отдельные антибиотики группы Watch рекомендованы в качестве основных эмпирических препаратов первого или второго выбора для лечения ограниченного числа специфических инфекционных синдромов.			

Группа Reserve - АНТИБИОТИКИ РЕЗЕРВНОЙ ГРУППЫ

В эту группу входят антибиотики и классы антибиотиков, которые должны быть зарезервированы для лечения подтвержденных или предполагаемых инфекций, вызванных микроорганизмами с множественной лекарственной устойчивостью. Антибиотики резервной группы должны рассматриваться как лекарственные средства "последней надежды". Отдельные антибиотики резервной группы включаются в Национальный перечень в качестве индивидуальных препаратов, если они имеют благоприятный профиль "польза/риск" и доказанную активность в отношении патогенов "высокого приоритета", определенных в Списке приоритетных патогенов ВОЗ, в частности, карбапенем-устойчивые Enterobacteriaceae. Эти антибиотики должны быть доступны, но их применение должно быть адаптировано к конкретным пациентам и условиям, когда все альтернативы не помогают или не подходят.

6.2.1. Антибиотики группы широкого доступа (ACCESS)

87	Амикацин [г]	Amikacinum	Раствор для инъекций: 50 мг/мл [с], 250 мг/мл (в виде сульфата) Препарат первого выбора: при высоком риске фебрильной нейтропении, тяжелой степени пиелонефрита или простатита. Препарат второго выбора: при сепсисе у новорожденных и детей [с]
88	Амоксициллин [г]	Amoxicillinum	Порошок для инъекций: 250 мг, 500 мг, 1 г Порошок для перорального раствора: 125 мг/5 мл, 250 мг/5 мл (в виде тригидрата) [с] Твердая пероральная лекарственная форма: 250 мг, 500 мг, 1 г (в виде тригидрата) Таблетки диспергируемые, делимые: 250 мг, 500 мг (в виде тригидрата) Препарат первого выбора: внебольничная пневмония, обострения ХОБЛ, средний отит, фарингит, синусит, сепсис у новорожденных и детей,

			неосложненное/осложненное тяжелое недоедание, прогрессирующий апикальный абсцесс зуба. Препарат второго выбора: острый бактериальный менингит
89	Амоксициллин + клавулановая кислота [r]	Amoxicillinum + clavulanic acid	Порошок для инъекций: 500 мг + 100 мг, 1000 мг + 200 мг Порошок для перорального раствора: 125 мг + 31,25 мг/5 мл и 250 мг + 62,5 мг/5 мл [с] Таблетки: 500 мг + 125 мг, 875 мг + 125 мг Таблетки диспергируемые, делимые: 200 мг + 28,5 мг [с]; 250 мг + 62,5 мг [с] Препарат первого выбора: тяжелая степень внебольничной пневмонии, осложненные внутриабдоминальные инфекции, обострения ХОБЛ, внутрибольничная пневмония, низкий риск фебрильной нейтропении, инфекции нижних мочевыделительных путей, синусит, инфекции кожи и мягких тканей Препарат второго выбора: инфекции костей и суставов, внебольничная пневмония, средний отит, хирургическая профилактика
90	Ампициллин [r]	Ampicillinum	Порошок для инъекций: 500 мг, 1 г

			Препарат первого выбора: тяжелая степень внебольничной пневмонии [с], осложненные внутриабдоминальные инфекции [с], осложненная тяжелая степень недоедания [с], сепсис у новорожденных и детей [с] Препарат второго выбора: острый бактериальный менингит
91	Бензатин бензилпенициллин [г]	Benzathinibenzyl-penicillinum	Порошок для инъекций: 900 мг (= 1,2 млн. МЕ) во флаконе [с]; 1,8 г (= 2,4 млн. МЕ) во флаконе Препарат первого выбора: сифилис
92	Бензилпенициллин [г]	Benzylpenicillinum	Порошок для инъекций: 300 мг (= 500 тыс. МЕ); 600 мг (= 1 млн. МЕ); 3 г (= 5 млн. МЕ) (в виде натриевой или калиевой соли) во флаконах Препарат первого выбора: тяжелая степень внебольничной пневмонии [с], осложненная тяжелая степень недоедания [с], сепсис у новорожденных и детей [с], сифилис Препарат второго выбора: острый бактериальный менингит
93	Цефалексин [г]	Cefalexinum	Порошок для перорального раствора: 125 мг/5 мл; 250 мг/5 мл (безводный)

			Твердая пероральная лекарственная форма: 250 мг, 500 мг (в виде моногидрата) Таблетки диспергируемые: 125 мг [с], 250 мг [с] Препарат первого выбора: инфекции кожи и мягких тканей Препарат второго выбора: обострения ХОБЛ, фарингит
94	Цефазолин [а] [г]	Cefazolinum	Порошок для инъекций: 1 г (в виде натриевой соли) во флаконе [а] не использовать у детей младше 1 месяца Препарат первого выбора: хирургическая профилактика Препарат второго выбора: инфекции костей и суставов
95	Хлорамфеникол [г]	Chloramphenicolum	Масляная суспензия для инъекций*: 0,5 г/мл (в виде натрия сукцината) в 2 мл ампуле *только для пробного лечения эпидемического менингита у детей старше 2 лет Порошок для инъекций: 1 г (в виде натрия сукцината) во флаконе Препарат второго выбора: острый бактериальный менингит
96	Клиндамицин [г]	Clindamycinum	Капсулы: 150 мг (в виде гидрохлорида) Раствор для инъекций: 150 мг/мл (в виде фосфата); 600 мг/4 мл; 900 мг/6 мл Порошок для

			перорального раствора: 75 мг/5 мл (в виде пальмитата гидрохлорида) [с] Препарат первого выбора: некротизирующий фасциит Препарат второго выбора: инфекции костей и суставов
97	Оксациллин [г]*	Oxacillinum	Таблетки: 250 мг Порошок для инъекций: 250 мг, 500 мг, 100 мг Препарат первого выбора: остеомиелит, эндокардит, инфекции мягких тканей *альтернатива - клоксациллин, диклоксациллин
98	Доксициклин [а]	Doxycyclinum	Пероральный раствор: 50 мг/5 мл (в виде кальция) [с] Порошок для перорального раствора: 25 мг/5 мл (в виде моногидрата) [с] Порошок для инъекций: 100 мг во флаконе Твердая пероральная лекарственная форма: 50 мг [с]; 100 мг (в виде гиклата) Таблетки диспергируемые: 100 мг (в виде моногидрата) [с] [а] - использование у детей младше 8 лет только для угрожающих жизни инфекций, когда нет альтернативы Препарат первого выбора: холера, ИППП, включая хламидиоз Препарат второго

			выбора: холера [с], внебольничная пневмония (легкой и средней тяжести), обострения ХОБЛ
99	Гентамицин [г]	Gentamicinum	Раствор для инъекций: 10 мг/мл; 40 мг/мл в 2 мл флаконе (в виде сульфата) Препарат первого выбора: острый бактериальный менингит [с], внебольничная пневмония тяжелой степени [с], осложненная внутриабдоминальная инфекция [с], осложненные нарушения питания [с], сепсис у новорожденных и детей [с] Препарат второго выбора: гонорея, хирургическая профилактика
10 0	Метронидазол [г]	Metronidazolum	Раствор для инъекций: 500 мг Пероральный раствор: 200 мг/5 мл (в виде бензоата) Суппозитории: 500 мг; 1 г Таблетки: 200 мг, 250 мг, 400 мг, 500 мг Препарат первого выбора: инфекция, ассоциированная <i>Clostridium difficile</i>, осложненная внутриабдоминальная инфекция, некротизирующий фасциит, хирургическая профилактика, трихомониаз Препарат второго выбора: осложненная внутриабдоминальная

			инфекция легкой и средней степени тяжести
10 1	Нитрофурантоин [г]	Nitrofurantoinum	Пероральный раствор: 25 мг/5 мл [с] Твердая пероральная лекарственная форма: 50 мг [с], 100 мг Препарат первого выбора: инфекции нижних мочевыводящих путей
10 2	Феноксиметилпенициллин [г]	Phenoxymethylpenicillinum	Порошок для перорального раствора: 250 мг/5 мл (в виде калиевой соли) Таблетки: 250 мг, 500 мг (в виде калиевой соли) Препарат первого выбора: внебольничная пневмония легкой и средней тяжести, фарингит, прогрессирующий апикальный абсцесс зуба
10 3	Бензилпенициллин прокаин* [г]	Benzylpenicillinum procain	Порошок для инъекций: 1 г (= 1 млн. МЕ), 3 г (= 3 млн. МЕ) во флаконе *не рекомендуется в качестве первой линии лечения неонатального сепсиса, за исключением применения обученными медицинскими работниками в случае высокой неонатальной смертности Препарат первого выбора: сифилис (врожденный) [с] Препарат второго выбора: сифилис
10 4	Спектиномицин [г]	Spectinomycinum	Порошок для инъекций: 2 г (в виде

			гидрохлорида) Препарат второго выбора: гонорея
10 5	Сульфаметоксазол + триметоприм [г]	Sulfamethoxazolum +trimethoprim	Раствор для инъекций: 80 мг + 16 мг/мл Пероральный раствор: 200 мг + 40 мг/5 мл Таблетки: 100 мг + 20 мг; 400 мг + 80 мг; 800 мг + 160 мг Таблетки диспергируемые: 100 мг + 20 мг [с] Препарат первого выбора: инфекции нижних мочевыводящих путей Препарат второго выбора: острая инвазивная диарея/бактериальная дизентерия
10 6	Триметоприм [г]	Trimethoprimum	Таблетки: 100 мг, 200 мг Пероральный раствор: 50 мг/5 мл [с] Препарат первого выбора: инфекции нижних мочевыводящих путей
6.2.2. Группа наблюдения (WATCH)			
10 7	Азитромицин [г]	Azithromycinum	Твердая пероральная лекарственная форма: 250 мг; 500 мг (безводный) Порошок для перорального раствора: 200 мг/5 мл Препарат первого выбора: холера, энтеритная лихорадка, гонорея, ИППП, включая хламидии, трахома, фрамбезия Препарат второго выбора: острая инвазивная бактериальная диарея/дизентерия, гонорея

10 8	Цефиксим* [г]	Cefiximum	Порошок для перорального раствора: 100 мг/5 мл [с] Твердая пероральная лекарственная форма: 200 мг, 400 мг (в виде тригидрата) Препарат второго выбора: острая инвазивная бактериальная диарея/дизентерия, гонорея
10 9	Цефотаксим* [г]	Cefotaximum	Порошок для инъекций: 250 мг, 500 мг, 2 г (в виде натриевой соли) *3-е поколение цефалоспоринов является выбором для применения у госпитализированных новорожденных Препарат первого выбора: острый бактериальный менингит, внебольничная пневмония тяжелой степени, осложненная внутриабдоминальная инфекция, госпитальная пневмония, пиелонефрит или простатит тяжелой степени Препарат второго выбора: инфекции костей и суставов, пиелонефрит или простатит легкой и средней тяжести, сепсис у новорожденных и детей [с]
11 0	Цефтриаксон* [а] [г]	Ceftriaxonum	Порошок для инъекций: 250 мг; 500 мг, 1 г, 2 г (в виде натриевой соли) *не применять с кальцием и избегать

			применения у детей с гипербилирубинемией [a] > 41 недель гестационного возраста Препарат первого выбора: острый бактериальный менингит, внебольничная пневмония тяжелой степени, осложненная внутриабдоминальная инфекция, госпитальная пневмония, пиелонефрит или простатит тяжелой степени, эндофтальмит, энтеритная лихорадка, некротизирующий фасциит Препарат второго выбора: острая инвазивная бактериальная диарея/дизентерия, инфекции костей и суставов, пиелонефрит или простатит легкой и средней тяжести, сепсис у новорожденных и детей [с]
11 1	Цефуроксим [г]	Cefuroximum	Порошок для инъекций: 250 мг, 750 мг, 1,5 г (в виде натриевой соли) Препарат второго выбора: хирургическая профилактика
11 2	Ципрофлоксацин [г]	Ciprofloxacinum	Пероральный раствор: 250 мг/5 мл (безводный) [с] Раствор для внутривенных инфузий: 2 мг/мл (в виде гиклата) [с] Твердая пероральная лекарственная форма: 100 мг [с], 250 мг, 500

			мг (в виде гидрохлорида) Препарат первого выбора: острая инвазивная бактериальная диарея/дизентерия, энтеритная лихорадка, фебрильная нейтропения низкого риска, пиелонефрит или простатит легкой и средней степени. Препарат второго выбора: холера, осложненная внутриабдоминальная инфекция легкой и средней степени тяжести
11 3	☐ Кларитромицин* [г]	Clarithromycinum	Порошок для перорального раствора: 125 мг/5 мл, 250 мг/5 мл Порошок для инъекций: 500 мг Твердая пероральная лекарственная форма: 250 мг [с], 500 мг *использовать также в комбинированной эрадикационной терапии H. Pylori. Препарат первого выбора: внебольничная пневмония тяжелой степени. Препарат второго выбора: фарингит
11 4	☐ Эритромицин [г]	Erythromycinum	Порошок для инъекций: 500 мг (в виде лактобионата) Порошок для перорального раствора: 125 мг/5 мл Твердая пероральная лекарственная форма: 250 мг, 500 мг (в виде стеарата или эстолата или этилсукцината) Препарат второго

			выбора: фарингит у детей
11 5	Пиперацillin+тазобактам [г]	Piperacillinum+tazobactam	Порошок для инъекций: 2 г + 250 мг, 4 г + 500 мг (в виде натриевой соли) Препарат первого выбора: осложненная внутриабдоминальная инфекция, фебрильная нейтропения высокого риска, госпитальная пневмония, некротизирующий фасциит
11 6	Ванкомицин* [г]	Vancomycinum	Порошок для инъекций: 125 мг, 250 мг, 500 мг, 1 г (в виде гидрохлорида) *порошок для инъекций можно использовать для перорального применения Препарат первого выбора: эндофтальмит, некротизирующий фасциит Препарат второго выбора: инфекция, ассоциированная Clostridium difficile, фебрильная нейтропения высокого риска
11 7	Цефтазидим [г]	Ceftazidimum	Порошок для инъекций: 250 мг или 1 г (в виде пентагидрата) Препарат первого выбора: эндофтальмит
11 8	☐ Меропенем* [а] [г]	Meropenemum	Порошок для инъекций: 500 мг, 1 г (в виде тригидрата) *осложненные внутрибрюшные инфекции и лихорадочная нейтропения высокого

			риска только при нейтропении. Меропенем предпочтителен для лечения острого бактериального менингита у новорожденных [a] - не использовать у детей младше 3 месяцев Препарат второго выбора: острый бактериальный менингит у новорожденных [с], осложненные внутрибрюшные инфекции, лихорадочная нейтропения высокого риска
11 9	Цефотаксим+сульбактам [г]	Cefotaximum+sulbactam	Порошок для инъекций: 1000 мг (цефотаксим) + 500 мг (сульбактам)
6.2.3. Резервная группа (RESERVE)			
12 0	Цефидерокол [г]	Cefiderocolum	Порошок для инъекций: 1 г (в виде сульфата оксилата)
12 1	Цефтазидим+авибактам [г]	Ceftazidimum+avibactam	Порошок для инъекций: 2 г + 0,5 г
12 2	Цефтолозан+тазобактам [г]	Ceftolozanum+tazobactam	Порошок для инъекций: 1 г + 0,5 г
12 3	Колистин [г]	Colistinum	Порошок для инъекций: 1 млн. МЕ (как колистемета натриевая соль)
12 4	Фосфомицин [г]	Fosfomycinum	Порошок для инъекций: 2 г, 4 г (в виде натриевой соли)
12 5	□ Линезолид [г]	Linezolidum	Раствор для внутривенных инъекций: 2 мг/мл Порошок для перорального раствора: 100 мг/5 мл Таблетки: 600 мг Таблетки диспергируемые: 150 мг [с]

12 6	Меропенем+ваборбактам [г]	Meropenemum+varobactam	Порошок для инъекций: 1 г (в виде тригидрата) + 1 г во флаконе
12 7	Полимиксин Б [г]	Polymyxinum B	Порошок для инъекций: 500000 МЕ (эквивалентный 50 мг полимиксина В) во флаконе
6.2.4. Противотуберкулезные лекарственные средства			
12 8	Этамбутол [г]	Ethambutolum	Таблетки: 100 мг, 400 мг (в виде гидрохлорида) Таблетки диспергируемые: 100 мг [с] Раствор для инъекций: 100 мг/мл, 10 мл, 20 мл
12 9	Этамбутол+изониазид+пиразинамид+рифампицин [г]	Ethambutolum+isoniazid+pyrazinamide+rifampicin	Таблетки: 275 мг + 75 мг + 400 мг + 150 мг
13 0	Этамбутол+изониазид+рифампицин [г]	Ethambutolum+isoniazid+rifampicin	Таблетки: 275 мг + 75 мг + 150 мг
13 1	Этионамид [г]	Ethionamidum	Таблетки: 250 мг Таблетки диспергируемые: 125 мг [с]
13 2	Изониазид [г]	Isoniazidum	Таблетки: 100 мг, 300 мг Таблетки диспергируемые: 100 мг [с] Раствор для инъекций: 100 мг/мл/5 мл
13 3	Изониазид+пиразинамид+рифампицин [г]	Isoniazidum+pyrazinamide+rifampicin	Таблетки диспергируемые: 50 мг + 150 мг + 75 мг [с]
13 4	Изониазид+рифампицин [г]	Isoniazidum+rifampicin	Таблетки: 75 мг + 150 мг, 150 мг + 300 мг Таблетки диспергируемые: 50 мг + 75 мг [с]
13 5	Изониазид+рифапентин [г]	Isoniazidum+rifapentine	Таблетки делимые: 300 мг + 300 мг
13 6	Моксифлоксацин [г]	Moxifloxacinum	Таблетки: 400 мг
13 7	Пиразинамид [г]	Pyrazinamidum	Таблетки: 400 мг, 500 мг Таблетки

			диспергируемые: 150 мг
13 8	Рифабутин [г]	Rifabutinum	Твердая пероральная лекарственная форма: 150 мг* *использовать только у ВИЧ-пациентов, получающих ингибиторы протеазы
13 9	Рифампицин [г]	Rifampicinum	Твердая пероральная лекарственная форма: 150 мг; 300 мг Лиофилизат для приготовления раствора для инъекций: 150 мг
14 0	Рифапентин [г]	Rifapentinum	Таблетки: 150 мг, 300 мг
Препараты для лечения туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ-ТБ) должны применяться в специализированных центрах, придерживающихся стандартов ВОЗ по борьбе с туберкулезом			
14 1	Амикацин [г]	Amikacinum	Раствор для инъекций: 250 мг/мл (в виде сульфата)
14 2	Амоксициллин+клавулановая кислота* [г]	Amoxicillinum + clavulanic acid*	Порошок для перорального раствора: 250 мг (в виде тригидрата) + 62,5 мг (в виде калиевой соли)/5 мл [с] Таблетки: 500 мг (в виде тригидрата) + 125 мг (в виде калиевой соли) *только для использования в комбинации с меропенемом или имипенемом+циластатин
14 3	Бедаквилин [г]	Bedaquilinum	Таблетки: 20 мг [с], 100 мг
14 4	Клофазимин [г]	Clofaziminum	Твердая пероральная лекарственная форма: 50 мг, 100 мг
14 5	□ Циклосерин [г]	Cycloserinum	Твердая пероральная лекарственная форма: 125 мг [с], 250 мг
14	Деламанид* [г]	Delamanidum	Таблетки диспергируемые: 25 мг

6			[с] Таблетки: 50 мг
14 7	☐ Этионамид* [г]	Ethionamidum	Таблетки: 250 мг Таблетки диспергируемые: 125 мг [с] *альтернатива - протионамид
14 8	Левифлоксацин [г]	Levofloxacinum	Таблетки: 250 мг, 500 мг, 750 мг Таблетки диспергируемые: 100 мг [с]
14 9	Линезолид [г]	Linezolidum	Таблетки: 600 мг Таблетки диспергируемые: 150 мг [с]
15 0	☐ Меропенем* [г]	Meropenemum	Порошок для инъекций: 500 мг, 1 г (в виде тригидрата) *альтернатива - имипенем+циластатин
15 1	Моксифлоксацин [г]	Moxifloxacinum	Таблетки: 400 мг Таблетки диспергируемые: 100 мг [с]
15 2	Натрия парааминосалицилат [г]	p-aminosalicylate sodium	Порошок для перорального раствора: 5,52 г в саше (эквивалентно 4 г парааминосалицилово й кислоты)
15 3	Претоманид [г]	Pretomanidum	Таблетки: 200 мг
15 4	Стрептомицин [с] [г]	Streptomycinum	Порошок для инъекций: 1 г (в виде сульфата)
6.3. Противогрибковые лекарственные средства			
15 5	Амфотерицин В	Amphotericinum B	Порошок для инъекций: 50 мг (в виде липосомального комплекса или натрия дезоксихолат)
15 6	Клотримазол	Clotrimazolum	Вагинальный крем: 1%; 10% Вагинальные таблетки: 100 мг; 500 мг

15 7	Флуконазол	Fluconazolum	Капсулы: 50 мг Раствор для инъекций: 2 мг/мл Пероральный раствор: 50 мг/5 мл Порошок для перорального раствора: 50 мг/5 мл [с]
15 8	Гризеофульвин	Griseofulvinum	Пероральный раствор: 125 мг/5 мл [с] Твердая пероральная лекарственная форма: 125 мг; 250 мг
15 9	Флукитозин	Flucytosinum	Капсулы: 250 мг Раствор для внутривенного введения: 2,5 г в 250 мл
16 0	Итраконазол*	Itraconazolum	Капсулы: 100 мг Пероральный раствор: 10 мг/мл *для лечения хронического аспергиллеза легких, гистоплазмоза, споротрихоза, паракокцидиоидомико за, микозов, вызванных <i>T. marneffe</i> и хромобластомикоза; а также профилактика гистоплазмоза и инфекций, вызванных <i>T. marneffe</i> , у больных СПИДом
16 1	Нистатин	Nystatinum	Пастилки: 100000 МЕ Жидкость для приема внутри: 100000 МЕ/мл [с] Пессарий: 100000 МЕ Твердая пероральная лекарственная форма: 500000 МЕ
16 2	Вориконазол*	Voriconazolum	Таблетки: 50 мг; 200 мг Порошок для инъекций: 200 мг Порошок для перорального

			раствора: 40 мг/мл *для лечения хронического аспергиллеза легких и острого инвазивного аспергиллеза
16 3	Калия йодид*	Potassium iodide	Раствор для ингаляций *при споротрихозе
16 4	☐ Микафунгин	Micafunginum	Порошок для инъекций: 50 мг (в виде натриевой соли), 100 мг (в виде натриевой соли)
6.4. Противовирусные лекарственные средства			
6.4.1. Противогерпетические лекарственные средства			
16 5	☐ Ацикловир	Aciclovirum	Пероральный раствор: 200 мг/5 мл [с] Порошок для инъекций: 250 мг (в виде натриевой соли) Таблетки: 200 мг
16 6	Валацикловир	Valaciclovirum	Твердая пероральная лекарственная форма: 500 мг, 1000 мг
16 7	Валганцикловир* [с]	Valganciclovirum	Порошок для перорального раствора: 50 мг/мл Таблетки: 450 мг *для лечения цитомегаловирусного ретинита (CMV)
6.4.2. Антиретровирусные лекарственные средства			
6.4.2.1. Нуклеозидные/нуклеотидные ингибиторы обратной транскриптазы			
16 8	Тенофовира дизопроксил фумарат	Tenofovirum disoproxil fumaxatis (TDF)	Таблетки: 300 мг (тенюфовира дизопроксил фумарат - эквивалентно 245 мг дизопроксил фумарата)
16 9	Тенофовир алафенамид	Tenofovirum alafenamide	Таблетки: 25 мг
17 0	Зидовудин*	Zidovudinum	Пероральная суспензия/раствор: 50 мг/ 5 мл *для профилактики вертикальной передачи новорожденным

			согласно клиническому руководству по ВИЧ
17 1	Ламивудин	Lamivudinum	Таблетки 150 мг *для двойной терапии в комбинации с долутегравином
6.4.2.2. Ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы			
17 2	Эфавиренз	Efavirenzum	Таблетки: 200 мг, 600 мг
17 3	Невирапин*	Nevirapinum	Пероральная суспензия/раствор: 50 мг/5 мл *для профилактики вертикальной передачи новорожденным согласно клиническому руководству по ВИЧ
6.4.2.3. Ингибиторы протеаз			
17 4	Ритонавир*	Ritonavirum	Таблетки (термостабильные): 25 мг; 100 мг *возможно использование в комбинированной терапии
17 5	Дарунавир [а]*	Darunavirum	Таблетки: 75 мг, 400 мг, 600 мг, 800 мг [а] не использовать у детей младше 3-х лет *возможно использование в комбинированной терапии
6.4.2.4. Ингибиторы интегразы			
17 6	Долутегравир [а]	Dolutegravirum	Таблетки диспергируемые делимые: 5 мг, 10 мг, 20 мг, 50 мг [с] [а] не использовать у новорожденных до 4 нед. и массой тела до 3 кг Таблетки: 50 мг [а] не использовать у детей массой тела меньше 25 кг

17 7	Ралтегравир*	Raltegravirum	Гранулы для пероральной суспензии: 100 мг в саше Таблетки жевательные: 25 мг, 100 мг Таблетки: 400 мг *для применения беременными женщинами и в схемах лечения второй линии в соответствии с рекомендациями ВОЗ
6.4.2.5. Комбинации антиретровирусных препаратов в фиксированных дозах			
17 8	Абакавир+Ламивудин*	Abacavirum+Lamvudinum	Таблетки диспергируемые, делимые: 120 мг (в виде сульфата) + 60 мг*, 60 мг + 30 мг* Таблетки покрытые оболочкой: 600 мг + 300 мг *применение в схемах лечения детей
17 9	Лопинавир+Ритонавир	Lopinavirum+Ritonavirum	Пероральный раствор: 400 мг + 100 мг/5 мл Таблетки: 100 мг + 25 мг; 200 мг + 50 мг; 40 мг + 10 мг
18 0	Эфавиренз + □ Эмтрицитабин* + Тенофовир	Efavirenzum+Emtricitabinum+Tenofovirum	Таблетки: 600 мг + 200 мг + 300 мг (тенофовир дизопроксил фумарат эквивалентно 245 мг тенофовир дизопроксилу) *альтернатива для эмтрицитабина может быть ламивудин, доза эфавиренца может быть также 400 мг, что позволяет улучшить переносимость лечения при сравнимой эффективности
18 1	□ Эмтрицитабин* + Тенофовир	Emtricitabinum+Tenofovirum	Таблетки: 200 мг + 300 мг (тенофовир дизопроксил фумарат - эквивалентен 245 мг

			тенофовир дизопроксилу) *альтернатива для эмтрицитабина может быть ламивудин
18 2	Атазанавир+ритонавир	Atazanavirum+ritonavir	Таблетки (термостабильные): 300 мг (в виде сульфата) + 100 мг
18 3	Абакавир+ламивудин+долутегравир*	Abacavir+lamivudinum+dolutegravirum	Таблетки диспергируемые: 60 мг + 30 мг + 5 мг*, 600 мг + 300 мг + 50 мг* *применение в схемах лечения детей
18 4	Ламивудин+Зидовудин	Lamivudinum+Zidovudinum	Таблетки: 30 + 60 мг [с]; 150 мг + 300 мг
18 5	Долутегравир+ламивудин+тенофовир*	Dolutegravirum+lamivudine+tenofovir	Таблетки: 50 мг + 300 мг + 300 мг (тенофовир дизопроксил фумарат) 50 мг + 300 мг + 25 мг (тенофовир алафенамид) *альтернатива для ламивудина может быть эмтрицитабин
6.4.3. Прочие противовирусные лекарственные средства			
18 6	Рибавирин*	Ribavirinum	Раствор для внутривенных инъекций: 800 мг и 1 г в 10 мл фосфатного буферного раствора Твердая пероральная лекарственная форма: 200 мг; 400 мг; 600 мг *для лечения вирусных геморрагических лихорадок
6.4.4. Лекарственные средства против гепатита			
6.4.4.1. Лекарственные средства для лечения гепатита В			
6.4.4.1.1. Нуклеозидные/нуклеотидные ингибиторы обратной транскриптазы			
18 7	Энтекавир	Entecavirum	Пероральный раствор: 0,05 мг/мл Таблетки: 0,5 мг; 1 мг
18 8	Тенофовира дизопроксил фумарат (TDF)	Tenofovirum	Таблетки: 300 мг (эквивалентно 245 мг тенофовира дизопроксила), 250 мг,

			200 мг, 150 мг
18 9	Тенофовира алафенамид (TAF)	Tenofovir alafenamide	Таблетки: 25 мг
6.4.4.2. Средства для лечения гепатита D			
19 0	Пегилированный интерферон Альфа (2a или 2b)	Pegilyted interferonum 2 alfa/beta	Флакон или шприц-ручка: 180 микрограмм (пегинтерферон альфа-2a), 80 микрограмм, 100 микрограмм (пегинтерферон альфа-2b)
6.4.4.3. Средства для лечения гепатита C			
6.4.4.3.1. Комбинации пангенетических противовирусных средств прямого действия			
19 1	Даклатасвир*	Daclatasvirum	Таблетки: 30 мг, 60 мг, 90 мг (в виде гидрохлорида) *применяется в комбинации с софосбувиром
19 2	Глекапревир+пибрентасвир	Glecaprevirum+pibrentasvir	Таблетки: 100 мг + 40 мг Гранулы: 50 мг + 20 мг в саше [с]
19 3	Софосбувир*	Sofosbuvirum	Таблетки: 200 мг, 400 мг *используется в комбинации с даклатасвиром
19 4	Софосбувир+велпатасвир	Sofosbuvirum+velpatasvir	Таблетки: 200 мг + 50 мг [с], 400 мг + 100 мг, 150 мг + 37,5 мг (в виде пессарий)
6.5. Противопротозойные лекарственные средства			
6.5.1. Противоямблиозные лекарственные средства			
19 5	☐ Метронидазол*	Metronidazolum	Раствор для инъекций: 500 мг в 100 мл во флаконе Пероральный раствор: 200 мг/5 мл (в виде бензота) Таблетки: 200 мг, 250 мг, 400 мг, 500 мг *в качестве альтернативы рекомендуется тинидазол
6.5.2. Противопневмоцитные и противотоксоплазмозные лекарственные средства			
19	Пириметамин	Pyrimethaminum	Таблетки: 25 мг

6			
19 7	Сульфадиазин	Sulfadiazinum	Таблетки: 500 мг
19 8	Сульфаметоксазол+триметоприм [r]	Sulfamethoxazolum+thrimethopri mum	Раствор для инъекций: 80 мг + 16 мг/мл в ампуле 5 мл; 80 мг + 16 мг/мл Пероральный раствор: 200 мг + 40 мг/5 мл [с] Таблетки: 100 мг + 20 мг; 400 мг + 80 мг [с]; 800 мг + 160 мг Таблетки диспергируемые: 100 мг + 20 мг [с]
7. Лекарственные средства против мигрени			
7.1. Для лечения острых приступов			
19 9	Ацетилсалициловая кислота	Acetylsalicylicacidum	Таблетки: 300 мг до 500 мг
20 0	Ибупрофен [с]	Ibuprofenum	Пероральный раствор: 100 мг/5 мл [с] Таблетки: 200 мг; 400 мг
20 1	Парацетамол	Paracetamolum	Пероральный раствор: 120 мг/5 мл или 125 мг/5 мл, 250 мг/5 мл [с] Суппозитории ректальные: 250 мг [с] Таблетки: 250 мг, 325 мг, 500 мг Таблетки диспергируемые: 100 мг, 250 мг [с]
20 2	Суматриптан	Sumatriptanum	Таблетки: 50 мг
7.2. Для профилактики мигрени			
20 3	Пропранолол	Propranololum	Таблетки: 20 мг; 40 мг (в виде гидрохлорида)
8. Иммуномодуляторы и противоопухолевые лекарственные средства			
8.1. Иммуномодуляторы при неонкологических заболеваниях			
20 4	☐ Адалимумаб* ±	Adalimumabum	Раствор для инъекций: 10 мг/0,2 мл [с], 20 мг/0,4 мл [с], 40 мг/0,8 мл, 40 мг/0,4 мл *альтернатива - цертолизумаб, этанерцепт, голимумаб, инфликсимаб,

			включая биосимиляры
20 5	Азатиоприн ±	Azathioprinum	Пероральный раствор: 10 мг/мл [с] Порошок для инъекций: 50 мг [с]; 100 мг (в виде натриевой соли) Таблетки: 25 мг [с] Таблетки (делимые): 50 мг
20 6	Циклоспорин	Ciclosporinum	Капсулы: 25 мг Концентрат для инъекций: 50 мг/мл Пероральный раствор: 100 мг/мл [с]
20 7	Такролимус ±	Tacrolimusum	Капсулы (быстрого высвобождения): 0,5 мг, 0,75 мг, 1 мг, 2 мг, 5 мг Гранулы для пероральной суспензии: 0,2 мг, 1 мг Раствор для инъекций: 5 мг/мл в ампулах по 1 мл
20 8	Микофенолата мофетил ±	Mycophenolatis mofetilum	Капсула: 250 мг, 500 мг
20 9	Эверолимус ±	Everolimus	Таблетки: 2,5 мг, 5 мг, 7,5 мг, 10 мг Таблетки диспергируемые: 2 мг, 3 мг, 5 мг
8.2. Противоопухолевые и поддерживающие лекарственные средства			
8.2.1. Цитотоксические средства			
21 0	Триоксид мышьяка* ±	Arsenicum trioxide	Концентрат для приготовления раствора для инфузий: 1 мг/мл; 2 мг/мл *острый промиелоцитарный лейкоз
21 1	Аспарагиназа*	Asparaginasum	Порошок для инъекций: 10000 МЕ *острый лимфобластный лейкоз
21 2	Блеомицин* ±	Bleomycinum	Порошок для инъекций: 15000 МЕ (в

			виде сульфата) *лимфома Ходжкина; саркома Капоши; герминогенная опухоль яичника; герминогенная опухоль яичек
21 3	Кальция фолинат* ±	Calcium folinate	Раствор для инъекций: 3 мг/мл, 7,5 мг/мл, 10 мг/мл Таблетки: 5 мг, 15 мг, 25 мг *лимфома Беркитта, ранние стадии рака толстой кишки; ранние стадии рака прямой кишки; гестационная трофобластическая неоплазия; метастатический колоректальный рак; остеосаркома
21 4	Бендамустин* ±	Bendamustinum	Раствор для инъекций: 45 мг/0,5 мл; 180 мг/2 мл *хронический лимфолейкоз, фолликулярная лимфома
21 5	Капецитабин* ±	Capecitabinum	Таблетки: 150 мг; 500 мг *ранние стадии рака толстой кишки; ранние стадии рака прямой кишки; метастатический рак молочной железы; метастатический колоректальный рак
21 6	Карбоплатин* ±	Carboplatinum	Раствор для инъекций: 50 мг/5 мл; 150 мг/15 мл; 450 мг/45 мл; 600 мг/60 мл *рак шейки матки, ранние стадии рака молочной железы; эпителиальный рак яичника; рак головы/шеи, низкодифференциро- ванная глиома, рак носоглотки,

			нефробластома (рак Вильмса); немелкоклеточный рак легких; остеосаркома; ретинобластома, герминогенная опухоль яичек и яичников
21 7	Хлорамбуцил*	Chlorambucilum	Таблетки: 2 мг *хроническая лимфоцитарная лейкемия
21 8	Цисплатин*	Cisplatinum	Раствор для инъекций: 10 мг/10 мл, 20 мг/20 мл, 50 мг/50 мл; 100 мг/100 мл *рак шейки матки; рак головы и шеи; рак носоглотки; низкодифференцированная глиома, немелкоклеточный рак легкого; остеосаркома; герминогенная опухоль яичника; герминогенная опухоль яичек
21 9	Циклофосфамид*	Cyclophosphamidum	Порошок для инъекций: 500 мг, 1 г, 2 г Твердая пероральная лекарственная форма: 25 мг, 50 мг *острый лимфобластный лейкоз, апластическая крупноклеточная лимфома, лимфома Беркитта; хронический лимфоцитарный лейкоз; диффузная В-крупноклеточная лимфома; ранние стадии рака молочной железы; гестационная трофобластическая неоплазия; саркома Юинга; лимфома Ходжкина; фолликулярная лимфома; низкодифференцированная глиома,

			рабдомиосаркома; метастатический рак молочной железы, мультиформная миелома, нефробластома (рак Вильмса)
22 0	Цитарабин*	Cytarabinum	Раствор для инъекций: 100 мг/мл Порошок для инъекций: 100 мг *острый миелобластный лейкоз; острый лимфобластный лейкоз; промиелолейкоз; апластическая крупноклеточная лимфома, лимфома Беркитта, гистиоцитоз клеток Лангерганса
22 1	Дакарбазин* ±	Dacarbazine	Порошок для инъекций: 100 мг, 200 мг *лимфома Ходжкина
22 2	Дактиномицин* ±	Dactinomycinum	Порошок для инъекций: 500 мкг *саркома Юинга, гестационная трофобластическая неоплазия; рабдомиосаркома; нефробластома (рак Вильмса)
22 3	Даунорубицин* ±	Daunorubicinum	Раствор для инъекций: 2 мг/мл, 5 мг/мл (в виде гидрохлорида) Порошок для инъекций: 20 мг, 50 мг (в виде гидрохлорида) *острый миелобластный лейкоз; острый лимфобластный лейкоз, острый промиелолейкоз
22 4	Доцетаксел* ±	Docetaxelum	Раствор для инъекций: 20 мг/мл; 40 мг/мл *ранние стадии рака молочной железы;

			метастатический рак молочной железы; метастатический рак предстательной железы
22 5	Доксорубицин*	Doxorubicinum	Раствор для инъекций: 2 мг/мл (в виде гидрохлорида) Порошок для инъекций: 10 мг; 50 мг (в виде гидрохлорида) *острый лимфобластный лейкоз; апластическая крупноклеточная лимфома, лимфома Беркитта, диффузная В-крупноклеточная лимфома; ранние стадии рака молочной железы; лимфома Ходжкина; саркома Капоши; фолликулярная лимфома; метастатический рак молочной железы; остеосаркома; саркома Юинга; рак Вильмса; мультиформная миелома
22 6	Этопозид*	Etoposidum	Капсулы: 50 мг, 100 мг Раствор для инъекций: 20 мг/мл Порошок для инъекций: 100 мг (в виде фосфата) *острый лимфобластный лейкоз; острый миелоидный лейкоз, апластическая крупноклеточная лимфома, герминогенная опухоль яичек; гестационная трофобластическая неоплазия; лимфома Ходжкина; немелкоклеточный рак легкого;

			герминогенная опухоль яичников; ретинобластома; саркома Юинга; лимфома Беркитта, рак Вильмса
22 7	Флударабин*	Fludarabinum	Порошок для инъекций: 50 мг (в виде фосфата) Таблетки: 10 мг *хронический лимфолейкоз
22 8	Флуороурацил*	Fluorouracilum	Раствор для инъекций: 50 мг/мл *ранние стадии рака молочной железы; ранние стадии рака толстой кишки; ранние стадии рака прямой кишки; метастатический колоректальный рак; рак носоглотки
22 9	Гемцитабин* ±	Gemcitabinum	Порошок для инъекций: 200 мг, 1 г *эпителиальный рак яичников; немелкоклеточный рак легкого
23 0	Гидроксикарбамид*	Hydroxycarbamidum	Твердая пероральная лекарственная форма: 100 мг [с], 200 мг; 300 мг, 400 мг, 500 мг, 1 г *хронический миелоидный лейкоз
23 1	Ифосфамид* ±	Ifosfamidum	Порошок для инъекций: 500 мг; 1 г, 2 г *апластическая крупноклеточная лимфома, лимфома Беркитта, рак Вильмса, герминогенная опухоль яичников; герминогенная опухоль яичек; остеосаркома; рабдомиосаркома; саркома Юинга
23	Иринотекан*	Irinotecanum	Раствор для инъекций:

2			40 мг/2 мл; 100 мг/5 мл; 500 мг/25 мл *метастатический колоректальный рак, нефробластома (рак Вильмса), рабдомиосаркома
23 3	Мелфалан*	Melphalanum	Таблетки: 2 мг Порошок для инъекций: 50 мг *множественная миелома
23 4	Меркаптопурин*	Mercaptopurinum	Таблетки: 50 мг Пероральный раствор: 20 мг/мл [с] *острый лимфобластный лейкоз; острый промиелолейкоз, гистиоцитоз клеток Лангерганса
23 5	Метотрексат*	Methotrexatum	Концентрированный раствор для инъекций: 1000 мг/10 мл Раствор для инъекций: 50 мг/2 мл Порошок для инъекций: 50 мг (в виде натриевой соли) Таблетки: 2,5 мг (в виде натриевой соли) *ранние стадии рака молочной железы; гестационная трофобластическая неоплазия; остеосаркома; острый лимфобластный лейкоз; острый промиелолейкоз, апластическая крупноклеточная лимфома, лимфома Беркитта, гистиоцитоз клеток Лангерганса
23 6	Оксалиплатин*	Oxaliplatinum	Раствор для инъекций: 50 мг/10 мл; 100 мг/20 мл; 200 мг/40 мл Порошок для инъекций: 50 мг; 100 мг

			*рак толстой кишки на ранней стадии, метастатический колоректальный рак
23 7	Паклитаксел*	Paclitaxelum	Раствор для инъекций: 6 мг/мл *рак шейки матки, эпителиальный рак яичников, рак молочной железы на ранней стадии, метастатический рак молочной железы, саркома Капоши, рак носоглотки, немелкоклеточный рак легких, герминогенная опухоль яичника
23 8	Пегаспаргаза* ±	Pegaspargasum	Раствор для инъекций: 3750 ЕД/5 мл Порошок для инъекций: 3750 ЕД *острый лимфобластный лейкоз Включая высококачественные биосимиляры
23 9	Прокарбазин [с]*	Procarbazine	Капсулы: 50 мг (в виде гидрохлорида) *лимфома Ходжкина
24 0	Тиогуанин [с]*	Tioguaninum	Твердая пероральная лекарственная форма: 40 мг *острый лимфобластный лейкоз
24 1	Винбластин*	Vinblastinum	Раствор для инъекций: 10 мг/10 мл (в виде сульфата) Порошок для инъекций: 10 мг (в виде сульфата) *апластическая крупноклеточная лимфома, лимфома Ходжкина; саркома Капоши; гистиоцитоз клеток Лангерганса, низкодифференцированная глиома,

			герминогенная опухоль яичка; герминогенная опухоль яичников
24 2	Винкристин	Vincristinum	Раствор для инъекций: 1 мг/мл, 2 мг/2 мл (в виде сульфата) Порошок для инъекций: 1 мг; 5 мг (в виде сульфата) *диффузная В-крупноклеточная лимфома; гестационная трофобластическая неоплазия; лимфома Ходжкина; саркома Капоши; фолликулярная лимфома; ретинобластома; рабдомиосаркома; саркома Юинга; острый лимфобластный лейкоз; рак Вильмса; лимфома Беркитта, гистиоцитоз клеток Лангерганса, низкодифференцированная глиома
24 3	Винорелбин	Vinorelbinum	Капсулы: 20 мг; 30 мг; 80 мг Раствор для инъекций: 10 мг/мл *немелкоклеточный рак легких, метастатический рак молочной железы, рабдомиосаркома
8.2.2. Таргетная терапия			
24 4	Полностью транс-ретиноевая кислота (ATRA)* ±	all-trans retinoid acid (ATRA)	Капсулы: 10 мг *острый промиелоцитарный лейкоз
24 5	Бортезомиб* ±	Bortezomib	Порошок для инъекций: 3,5 мг *мультиформная миелома
24 6	Дазатиниб* ±	Dasatinib	Таблетки: 20 мг, 50 мг, 70 мг, 80 мг, 100 мг,

			140 мг *иматиниб- резистентный хронический миелоидный лейкоз
24 7	□ Эрлотиниб* ±	Erlotinib	Таблетки: 100 мг, 150 мг *мутация EGFR- положительный прогрессирующий немелкоклеточный рак легких альтернативные препараты - афатиниб, гефитиниб
24 8	Эверолимус* ±	Everolimus	Таблетки: 2,5 мг, 5 мг, 7,5 мг, 10 мг Таблетки диспергируемые: 2 мг, 3 мг, 5 мг *субэпендимальная гигантоклеточная астроцитома
24 9	Ибрутиниб* ±	Ibrutinib	Капсулы: 140 мг *рецидивирующий/ре- фрактерный хронический лимфолейкоз
25 0	Иматиниб* ±	Imatinib	Твердая пероральная лекарственная форма: 100 мг; 400 мг *хронический миелоидный лейкоз, стромальная опухоль желудочно-кишечного тракта, острый лимфобластный лейкоз с положительной Филадельфийской хромосомой
25 1	Нилотиниб* ±	Nilotinib	Капсулы: 150 мг, 200 мг *иматиниб- резистентный хронический миелоидный лейкоз
25 2	Ритуксимаб* ±	Rituximab	Инъекция (внутривенная): 100 мг/10 мл; 500 мг/50 мл *лимфома Беркитта,

			диффузная В-крупноклеточная лимфома, хронический лимфолейкоз, фолликулярная лимфома
25 3	Трастузумаб* ±	Trastuzumab	Порошок для инъекций: 60 мг; 150 мг; 440 мг *ранняя стадия HER2-позитивного рака молочной железы, метастатический HER2-позитивный рак молочной железы
25 4	Филграстим* ±	Filgrastim	Раствор для инъекций: 120 мкг/0,2 мл; 300 мкг/0,5 мл; 480 мкг/0,8 мл в предварительно заполненном шприце Раствор для инъекций: 300 мкг/мл; 480 мкг/1,6 мл *первичная профилактика у пациентов с высоким риском развития фебрильной нейтропении, связанной с миелотоксической химиотерапией; вторичная профилактика для пациентов, у которых развилась нейтропения после предшествующей миелотоксической химиотерапии; для облегчения введения схем химиотерапии с высокой дозировкой
25 5	Леналидомид* ±	Lenalidomidum	Капсулы: 25 мг *мультиформная миелома
25 6	□ Ниволумаб* ±	Nivolumabum	Концентрированный раствор для инфузий: 10 мг/мл *метастатическая меланома

			альтернатива - пембролизумаб
25 7	Пегфилграстим* ±	Pegfilgrastim	Раствор для инъекций: 6 мг/0,6 мл в предварительно заполненном шприце *первичная профилактика у пациентов с высоким риском развития фебрильной нейтропении, связанной с миелотоксической химиотерапией; вторичная профилактика для пациентов, у которых развилась нейтропения после предшествующей миелотоксической химиотерапии; для облегчения введения схем химиотерапии с высокой дозировкой
25 8	Пертузумаб* ±	Pertuzumabum	Концентрат для приготовления раствора для инфузий: 420 мг - 14 мл (30 мг/мл) *метастатический рак молочной железы, в комбинации с транстузумабом; в качестве неoadъювантной и адъювантной терапии при местно- распространенном, отечно- инфильтративном или раннем (первично- операбельном) РМЖ с гиперэкспрессией HER2
8.2.3. Гормоны и антигормоны			
25 9	□ Абиратерон*	Abirateronum	Таблетки: 250 мг, 500 мг *метастатический кастрационно- резистентный рак предстательной

			железы
26 0	☐ Анастрозол*	Anastrozolum	Таблетки: 1 мг *ранние стадии рака молочной железы; метастатический рак молочной железы
26 1	Бикалутамид*	Bicalutamidum	Таблетки: 50 мг *метастатический рак предстательной железы; альтернатива - флутамид
26 2	Дексаметазон*	Dexamethasonum	Раствор для инъекций: 4 мг/мл (в виде динатриевой соли фосфата) Пероральный раствор: 2 мг/5 мл [с] Таблетки: 2 мг [с], 4 мг *острый лимфобластный лейкоз, апластическая крупноклеточная лимфома, лимфома Беркитта, мультиформная лимфома
26 3	Гидрокортизон*	Hydrocortisonum	Порошок для инъекций: 100 мг (в виде натрия сукцината) *острый лимфобластный лейкоз, лимфома Беркитта
26 4	☐ Лейпрорелин*	Leiporelinum	Раствор для инъекций: 7,5 мг, 22,5 мг в предварительно заполненном шприце *ранние стадии рака молочной железы, метастатический рак предстательной железы альтернатива - гoserelin
26 5	Метилпреднизолон [с]*	Methylprednisolonum	Раствор для инъекций: 40 мг/мл (в виде сукцината натрия) в 1 мл флакона для однократной дозы и в 5 мл флаконах для многократной дозы; 80

			мг/мл (в виде сукцината натрия) в 1 мл флакона для однократной дозы *острый лимфобластный лейкоз, лимфома Беркитта
26 6	☐ Преднизолон*	Prednisolonum	Пероральный раствор: 5 мг/мл [с] Таблетки: 5 мг; 25 мг *хронический лимфолейкоз; диффузная В-крупноклеточная лимфома; лимфома Ходжкина; фолликулярная лимфома, острый лимфобластный лейкоз; лимфома Беркитта, апластическая крупноклеточная лимфома, гистиоцитоз клеток Лангерганса, мультиформная миелома, метастатический кастрационно-резистентный рак предстательной железы
26 7	Тамоксифен*	Tamoxifenum	Таблетки: 10 мг; 20 мг (в виде цитрата) *ранние стадии рака молочной железы; метастатический рак молочной железы
8.2.4. Поддерживающее лечение			
26 8	Аллопуринол [с]*	Allopurinolum	Таблетки: 100 мг, 300 мг *синдром лизиса опухоли
26 9	Месна* ±	Mesna	Раствор для инъекций: 100 мг/мл Таблетки: 400 мг; 600 мг *герминогенная опухоль яичка; герминогенная

			опухоль яичников; остеосаркома; рабдомиосаркома; саркома Юинга, лимфома Беркитта, нефробластома (рак Вильмса)
27 0	Расбуриказ* ±	Rasburicasum	Концентрированный раствор для инфузий: 4 мг/5 мл Раствор для инфузий: 4 мг/100 мл *заболевания костей, связанные со злокачественными новообразованиями
9. Лечебное питание			
27 1	Готовое к употреблению лечебное питание [с]*	Ready-to-use therapeutic food	Для энтерального и парентерального питания *состав питательных веществ согласно ведению тяжелой острой недостаточности питания (жиры, липиды, белки, аминокислоты и пр.)
10. Лекарственные средства, влияющие на систему крови			
10.1. Противоанемические средства			
27 2	Соль железа*	Ferrous salt	Пероральные и парентеральные формы *детям - из расчета 2- 3 мг/кг массы тела элементарного железа в зависимости от тяжести; взрослым - из расчета 120-180 мг элементарного железа в сутки
27 3	Фолиевая кислота*	Folic acidum	Таблетки: 400 мкг*; 1 мг; 5 мг *предзачаточное применение для профилактики дефектов нервной трубки; женщинам репродуктивного возраста с железодефицитной

			анемией назначается в дозе 0,4 мг ежедневно в течение 3-х месяцев
27 4	Гидроксокобаламин*	Hydroxocobalaminum	Раствор для инъекций: 1 мг/мл (в виде ацетата, гидрохлорида или сульфата) *при мегалобластной анемии, послеоперационная анемия, дефицит фактора Касла
27 5	Стимуляторы эритропоэза: эритропоэтин альфа, бета, зета; дарбэпоэтин альфа метоксиполиэтилен-гликоль-эпоэтин бета	Erythropoiesis-stimulating agents	Раствор для инъекций: предварительно заполненный шприц 1000 МЕ/0,5 мл; 2000 МЕ/0,5 мл; 3000 МЕ/0,3 мл; 4000 МЕ/0,4 мл; 5000 МЕ/0,5 мл; 6000 МЕ/0,6 мл; 8000 МЕ/0,8 мл; 10000 МЕ/1 мл; 20000 МЕ/0,5 мл; 40000 МЕ/1 мл
10.2. Лекарственные средства, влияющие на коагуляцию			
27 6	☐ Дабигатран*	Dabigatranum	Капсулы: 110 мг, 150 мг *альтернатива: аликсабан, эдоксабан, ривароксабан
27 7	☐ Эноксапарин*	Enoxaparinesod-ium	Раствор для инъекций: ампулы или предварительно заполненный шприц 20 мг/0,2 мл; 40 мг/0,4 мл; 60 мг/0,6 мл; 80 мг/0,8 мл; 100 мг/1 мл; 120 мг/0,8 мл; 150 мг/1 мл *альтернатива - надропарин и далтепарин
27 8	Натрий гепарин	Heparin sodium	Раствор для инъекций: 1000 МЕ/мл; 5000 МЕ/мл; 20000 МЕ/мл
27 9	Фитоменадион	Phytomenadionum	Раствор для инъекций: 1 мг/мл [с]; 10 мг/мл Таблетки: 10 мг
28 0	Протамина сульфат	Protaminum sulfate	Раствор для инъекций: 10 мг/мл

28 1	Транексамовая кислота	Tranexamic acidum	Раствор для инъекций: 100 мг/мл
28 2	□ Варфарин	Warfarinum	Таблетки: 1 мг; 2 мг; 5 мг (в виде натриевой соли)
28 3	Десмопрессин [с]	Desmopressinum	Раствор для инъекций: 4 мкг/мл (в виде ацетата) Назальный спрей: 10 мкг (в виде ацетата) в каждой дозе
10.3. Другие лекарственные средства для гемоглобинопатий			
28 4	Деферасирокс	Deferasiroxum	Таблетки диспергируемые: 100 мг; 125 мг; 250 мг; 400 мг; 500 мг Таблетки (покрытые пленочной оболочкой): 90 мг; 180 мг; 360 мг
28 5	Дефероксамин	Deferoxaminum	Порошок для инъекций: 500 мг (в виде мезилата)
28 6	Гидроксикарбамид	Hydroxycarbamidum	Твердая пероральная лекарственная форма: 100 мг [с], 200 мг, 500 мг, 1 г
11. Продукты крови человеческого происхождения и плазмозаменители			
11.1. Кровь и компоненты крови			
28 7	Криопреципитат	С cryoprecipitatum	Раствор для инъекций: замороженная жидкость в пакете или лиофилизированный, содержащий: - > 50 МЕ фактора VIII - > 100 МЕ в - > 140 мг свертываемого фибриногена на единицу
28 8	Свежезамороженная плазма	Fresh-frozen plasma	
28 9	Тромбоцитарная масса	Massa trombocytarum	Гемаконовый мешок, содержащий 50 мл тромбоцитов
29 0	Эритроцитарная масса	Massa erythrocytarum	1 доза/250 мл
29 1	Лейкоцитарная масса	Massa leukocytarum	1 доза/500 мл, в ней должно содержаться не менее 10×10^9

			гранулоцитов
29 2	Раствор Рингера	Ringer's solution	Раствор для инъекций
11.2. Препараты, полученные из плазмы крови			
11.2.1. Человеческие иммуноглобулины			
29 3	anti-D иммуноглобулин	anti-D immunoglobulinum	Раствор для инъекций: 250 мкг в одноразовом шприце
29 4	Антирабический иммуноглобулин	anti-rabies immunoglobulinum	Раствор для инъекций: 150 МЕ/мл
29 5	Противостолбнячный иммуноглобулин	anti-tetanus immunoglobulinum	Раствор для инъекций: 500 МЕ
29 6	Нормальный иммуноглобулин*	normal immunoglobulinum	Внутримышечное введение: 16% белковый раствор Подкожное введение: 15%; 16% белковый раствор *первичный иммунодефицит. Внутривенное введение: 5%; 10% белковый раствор *первичный иммунодефицит, болезнь Кавасаки, гистиоцитоз клеток Лангерганса
11.2.2. Факторы коагуляции крови			
29 7	Фактор свертывания VIII	Coagulationfactor VIII	Порошок для инъекций: 250 МЕ, 500 МЕ, 1000 МЕ
29 8	☐ Фактор свертывания IX	Coagulation factor IX	Порошок для инъекций: 250 МЕ, 500 МЕ, 1000 МЕ
11.2.3. Плазмозамещающие лекарственные средства			
29 9	☐ Декстран 70	Dextranum	Раствор для инъекций: 6%
12. Сердечно-сосудистые лекарственные средства			
12.1. Антиангинальные средства			
30 0	☐ Бисопролол*	Bisoprololum	Таблетки: 1,25 мг, 5 мг *альтернатива - метопролол и карведилол
30 1	Глицерил тринитрат	Glycerylum trinitrate	Таблетки сублингвальные: 500 мкг Раствор для инъекций:

			10 мг/мл Раствор для инфузий: 1 мг/мл Пластырь ТДТС: 10 мг/24 часа, 5 мг/24 часа Аэрозоль для сублингвального применения: 0,4 мг/доза (1%)
30 2	Изосорбида динитрат	Isosorbidum dinitrate	Таблетки сублингвальные: 5 мг Таблетки: 5 мг, 10 мг, 20 мг, 40 мг Капсулы: 20 мг, 40 мг Раствор для инъекций: 500 мкг/мл, 1 мг/мл Аэрозоль для сублингвального применения: 1,25 мг/доза - 200 доз
30 3	Верапамил	Verapamilum	Таблетки: 40 мг; 80 мг (в виде гидрохлорида)
12.2. Противоаритмические средства			
30 4	☐ Бисопролол*	Bisoprololum	Таблетки: 1,25 мг; 5 мг *альтернатива - метопролол и карведилол
30 5	Дигоксин	Digoxinum	Раствор для инъекций: 250 мкг/мл Пероральный раствор: 50 мкг/мл Таблетки: 62,5 мкг; 250 мкг
30 6	Эпинефрин*	Epinephrinum	Раствор для инъекций: 100 мкг/мл (в виде тартрата или гидрохлорида)
30 7	Лидокаин	Lidocainum	Раствор для инъекций: 20 мг (гидрохлорид)/мл
30 8	Верапамил	Verapamilum	Раствор для инъекций: 2,5 мг/мл (в виде гидрохлорида) Таблетки: 40 мг; 80 мг (в виде гидрохлорида)
30 9	Амиодарон	Amiodaronum	Раствор для инъекций: 50 мг/мл (в виде гидрохлорида)

			Таблетки: 100 мг; 200 мг; 400 мг (в виде гидрохлорида)
31 0	Прокаинамид*	Procainamidum	Раствор для инъекций: 100 мг/мл Таблетки: 0,25 мг *указан в клиническом руководстве по аритмиям
12.3. Антигипертензивные средства			
31 1	☐ Амлодипин	Amlodipinum	Таблетки: 5 мг (в виде малеата, мезилата или безилата)
31 2	☐ Бисопролол*	Bisoprololum	Таблетки: 1,25 мг; 5 мг *альтернатива - метопролол и карведилол
31 3	☐ Эналаприл	Enalaprilum	Пероральный раствор: 1 мг/мл (в виде малеата водорода) [с] Таблетки: 2,5 мг; 5 мг, 10 мг (в виде малеата водорода)
31 4	Лизиноприл*	Lisinoprilum	Таблетки: 2,5 мг, 5 мг, 10 мг, 20 мг *альтернатива - рамиприл, может использоваться в комбинации
31 5	Каптоприл*	Captoprilum	Таблетки: 25 мг, 50 мг *применяется в качестве неотложной помощи при гипертоническом кризе
31 6	Гидралазин*	Hydralazinum	Порошок для инъекций: 20 мг (в виде гидрохлорида) Таблетки: 25 мг; 50 мг (в виде гидрохлорида) *гидралазин внесен в Перечень только для применения в острых случаях тяжелой гипертензии, вызванной беременностью. Его применение при лечении гипертонической

			болезни не рекомендуется, так как имеются доказательства большей эффективности и безопасности других лекарственных средств
31 7	☐ Гидрохлортиазид*	Hydrochlorthiazi-dum	Пероральный раствор: 50 мг/5 мл Твердая пероральная лекарственная форма: 12,5 мг; 25 мг *альтернатива - хлорталидон, индапамид
31 8	☐ Лозартан*	Losartanum	Таблетки: 25 мг, 50 мг, 100 мг *альтернатива - валсартан, телмисартан; указан в клиническом руководстве по гипертонической болезни, назначается при противопоказаниях к ингибиторам АПФ
31 9	Метилдопа*	Methyldopa	Таблетки: 250 мг *метилдопа внесен в настоящий Перечень только для применения при лечении гипертонии, вызванной беременностью. Его применение при лечении гипертонической болезни не рекомендуется, так как имеются доказательства большей эффективности и безопасности других лекарственных средств
32 0	Нитропруссид натрия	Natrii nitroprussidum	Порошок для инфузий: 50 мг
12.4. Лекарственные средства, применяемые при сердечной недостаточности			

32 1	☐ Бисопролол*	Bisoprololum	Таблетки: 1,25 мг; 5 мг *альтернатива - метопролол и карведилол
32 2	Дигоксин	Digoxinum	Раствор для инъекций: 100 мкг/мл, 250 мкг/мл Пероральный раствор: 50 мкг/мл Таблетки: 62,5 мкг; 125 мкг, 250 мкг
32 3	☐ Эналаприл	Enalaprilum	Таблетки: 2,5 мг; 5 мг, 10 мг (в виде малеата водорода)
32 4	Лизиноприл*	Lisinoprilum	Таблетки: 2,5 мг, 5 мг, 10 мг, 20 мг *альтернатива - рамиприл
32 5	☐ Фуросемид*	Furosemidum	Раствор для инъекций: 10 мг/мл Пероральный раствор: 20 мг/5мл, 50 мг/5 мл [с] Таблетки: 20 мг, 40 мг *альтернатива - торасемид
32 6	☐ Гидрохлортиазид*	Hydrochlorthiazidum	Пероральный раствор: 50 мг/5 мл Твердая пероральная лекарственная форма: 25 мг *альтернатива - индапамид
32 7	Спиронолактон	Spirolactonum	Таблетки: 25 мг
32 8	☐ Лозартан	Losartanum	Таблетки: 25 мг, 50 мг, 100 мг
32 9	Допамин	Dopaminum	Раствор для инъекций: 40 мг/мл (в виде гидрохлорида)
33 0	Норэпинефрин	Norepinephrine	Раствор для инъекций: 2 мг/1 мл
33 1	Добутамин	Dobutamine	Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий: 250 мг
12.5. Антитромботические средства			
12.5.1. Антиагрегантные средства			
33	Ацетилсалициловая кислота	Acetylsalicylic acidum	Таблетки: 75 мг, 100

2			мг, 150 мг, 325 мг
33 3	Клопидогрел	Clopidogrelum	Таблетки: 75 мг; 300 мг
12.5.2. Тромболитические средства			
33 4	Стрептокиназа	Streptokinasum	Порошок для инъекций: 1,5 млн. МЕ
33 5	Алтеплаза*	Alteplasum	Порошок для инъекций: 10 мг, 20 мг, 50 мг *альтернатива - теноктеплаза, ретеплаза (при доступности)
12.6. Липидоснижающие средства			
33 6	☐ Симвастатин*	Simvastatinum	Таблетки: 5 мг, 10 мг, 20 мг, 40 мг *использовать у пациентов с высоким риском
33 7	Аторвастатин*	Atorvastatinum	Таблетки: 10 мг, 20 мг, 40 мг, 80 мг *альтернатива - розувастатин, рекомендуется в клинических руководствах по неинфекционным заболеваниям
13. Дерматологические лекарственные средства			
13.1. Противогрибковые средства			
33 8	☐ Миконазол	Miconazolum	Крем или мазь: 2% (в виде нитрата)
33 9	Тербинафин	Terbinafinum	Крем или мазь: 1% (в виде гидрохлорида)
34 0	Селена сульфид	Selenium sulfidum	Суспензия на основе детергента: 2%
34 1	Натрия тиосульфат	Sodium thiosulfatum	Раствор: 15%
13.2. Противомикробные средства			
34 2	Мупироцин	Mupirocinum	Крем: 2% (в виде соли кальция); Мазь: 2%
34 3	Перманганат калия	Kalii permanganas	Водный раствор: 1:10000
34 4	Сульфадiazин серебра [a]	Sulfadiazini Argentum	Крем: 1% [a] > 2 месяцев
13.3. Противовоспалительные и противозудные средства			

34 5	☐ Бетаметазон [а]	Betamethasonum	Крем или мазь: 0,1% (в виде валерата) [а] - для новорожденных предпочтителен гидрокортизон
34 6	☐ Гидрокортизон	Hydrocortisonum	Крем или мазь: 1% крем (в виде ацетата)
34 7	Каламин	Calaminum	Лосьон
13.4. Лекарственные средства, влияющие на дифференсацию и пролиферацию			
34 8	Бензола пероксид	Benzoyl peroxidum	Крем или лосьон: 5%
34 9	Калципотриол	Calcipotrolum	Крем или мазь: 50 мкг/мл (0,005%) Лосьон: 50 мкг/мл (0,005%)
35 0	Флуоурацил	Fluoroucilum	Мазь: 5%
35 1	Салициловая кислота	Salicylic acid	Раствор: 5%
35 2	Мочевина	Urea	Крем или мазь: 5%, 10%
35 3	Метотрексат	Methotrexatum	Таблетки: 2,5 мг, 10 мг (в виде натриевой соли)
13.5. Противочесоточные и противопедикулезные лекарственные средства			
35 4	☐ Бензилбензоат [а]	Benzylum benzoate	Крем или лосьон: 5% [а] не использовать у детей младше 2-х лет
35 5	Перметрин	Permethrinum	Крем: 5% Лосьон: 1%
14. Диагностические лекарственные средства			
14.1. Офтальмологические средства			
35 6	Флуоресцин	Fluoresceinum	Глазные капли: 1% (в виде натриевой соли)
35 7	** ☐ Тропикамид	Tropicamidum	Глазные капли: 0,5%
35 8	Атропин	Atropinum	Глазные капли: 1%
35 9	Циклопентолат	Cyclopentolatum	Глазные капли: 1%
14.2. Радиоконтрастные средства			
36 0	☐ Амидотризоат	Amidotriozoatum	Раствор для инъекций: 140 мг - 420 мг йода/мл (в виде натриевой соли или

			соли меглумаина)
36 1	Бария сульфат [с]	Barium sulfate	Водорастворимая суспензия
36 2	☐ Йогексол*/**	Iohexolum	Раствор для инъекций: 140 мг - 350 мг йода/мл в 5 мл, 10 мл, 20 мл ампулах *могут использоваться лекарственные средства одного и того же фармакологического класса при наличии финансовых средств; **ВОЗ рекомендует пересмотреть терапевтические альтернативы йогексолу у детей
36 3	☐ Меглумаина иотроксат	Megluminum iotroxate	Раствор для инъекций: 5 г - 8 г йода в 100 мл - 200 мл
15. Антисептические средства			
36 4	☐ Хлоргексидин	Chlorhexidinum	Раствор: 5% (в виде диглюконата)
36 5	☐ Этанол	Ethanolum	Раствор: 70% (денатурированный)
36 6	☐ Повидон йод	Povidon-Iodinum	Раствор: 10% (эквивалентен 1% доступного йода)
16. Диуретики			
36 7	Амилорид	Amiloridum	Таблетки: 5 мг (в виде гидрохлорида)
36 8	☐ Фуросемид*	Furosemidum	Раствор для инъекций: 10 мг/мл Пероральный раствор: 20 мг/5 мл, 50 мг/5 мл [с] Таблетки: 20 мг, 40 мг * альтернатива - торасемид
36 9	Гидрохлортиазид*	Hydrochlorthiazidum	Твердая пероральная лекарственная форма: 25 мг *альтернатива - хлорталидон, индапамид
37 0	Маннитол [с]	Mannitolum	Раствор для инъекций: 10%; 20%

37 1	Спиронолактон [с]	Spironolactonum	Таблетки: 25 мг
17. Желудочно-кишечные лекарственные средства			
37 2	Ферменты поджелудочной железы [с]	Pancreatic enzymes	Формы выпуска и дозировки должны быть подходящими по возрасту, включать липазу, протеазу и амилазу
17.1. Противоязвенные лекарственные средства			
37 3	☐ Омепразол*	Omeprazolum	Порошок для инъекций: 40 мг Порошок для перорального раствора: 20 мг; 40 мг Твердая пероральная лекарственная форма: 10 мг; 20 мг; 40 мг *альтернатива - пантопразол
37 4	Фамотидин	Famotidinum	Таблетки: 20 мг, 40 мг; Порошок для инъекций: 20 мг/мл
17.2. Противорвотные средства			
37 5	Дексаметазон	Dexamethasonum	Раствор для инъекций: 4 мг/мл (в виде динатриевой соли фосфата) Пероральный раствор: 0,5 мг/5 мл; 2 мг/5 мл Твердая пероральная лекарственная форма: 0,5 мг; 0,75 мг; 1,5 мг; 4 мг
37 6	Метоклопрамид [а]	Metoclopramidum	Раствор для инъекций: 5 мг/мл (в виде гидрохлорида) Пероральный раствор: 5 мг/5 мл [с] Таблетки: 10 мг (в виде гидрохлорида) [а] противопоказан новорожденным
37 7	☐ Ондансетрон [а]	Ondansetronum	Раствор для инъекций: 2 мг/мл (в виде гидрохлорида) Пероральный раствор: 4 мг/5 мл Твердая пероральная

			лекарственная форма: экв. 4 мг основы; экв. 8 мг основы; экв. 24 мг основы [а] не использовать у новорожденных до 1 месяца
378	Апрепитант	Aprepitantum	Капсулы: 80 мг, 125 мг, 165 мг Порошок для пероральной суспензии: 125 мг
17.3. Противовоспалительные средства			
379	☐ Сульфасалазин	Sulfasalazinum	Удерживающая клизма Суппозитории: 500 мг Таблетки: 500 мг
380	Гидрокортизон	Hydrocortisonum	Удерживающая клизма: 100 мг/60 мл Суппозитории: 25 мг (в виде ацетата)
381	Преднизолон	Prednisolonum	Удерживающая клизма: 20 мг/100 мл (в виде натрия фосфата)
17.4. Слабительные средства			
382	☐ Сenna	Sennum	Таблетки: 7,5 мг (традиционные лекарственные дозы)
383	Бисакодил	Bisacodylum	Таблетки: 5 мг
17.5. Лекарственные средства при диарее			
17.5.1. Пероральные регидратационные средства			
384	Соли для пероральной регидратации	Oral rehydration salts - zinc sulfatum	Порошок для разведения в 200 мл, 500 мл: глюкозы: 75 мэкв; натрия: 75 мэкв или ммоль/л; хлорид: 65 мэкв или ммоль/л; калия: 20 мэкв или ммоль/л; цитрат: 10 ммоль/л; осмолярность: 245 мОсм/л; глюкозы: 13,5 г/л; хлорид натрия: 2,6 г хлорида калия: 1,5 г/л; дигидрата тринатрий цитрата*: 2,9 г/л *тринатрий цитрата

			дигидрат может быть заменен раствором гидрокарбоната натрия (бикарбоната натрия) 2,5 г/л. Однако, поскольку стабильность последнего состава очень низкая, ее рекомендуется использовать только тогда, когда она производится для немедленного использования
17.5.2. Лекарственные средства при диарее			
38 5	Цинка сульфат*	Zincum sulfatis	Твердая пероральная лекарственная форма: 20 мг *при острой тяжелой диарее цинка сульфат используется в качестве дополнения к соли для пероральной регидратации
18. Лекарственные средства для лечения эндокринных заболеваний			
18.1. Гормоны надпочечников и синтетические аналоги			
38 6	Гидрокортизон	Hydrocortisonum	Таблетки: 5 мг; 10 мг; 20 мг
38 7	Флудрокортизон	Fludrocortisonum	Таблетки: 100 мкг (в виде ацелата)
18.2. Андрогены			
38 8	Тестостерон	Testosteronum	Раствор для инъекций: 200 мг (в виде энантата)
18.3. Эстрогены			
18.4. Прогестины			
38 9	Медروксипрогестерона ацетат*	Medroxyprogesteronum acetatum	Таблетки: 5 мг *альтернатива - медроксипрогестерон ацетат
18.5. Лекарственные средства для лечения сахарного диабета			
18.5.1. Инсулины			
39 0	Инсулин (растворимый)*	Insulinum	Раствор для инъекций: 40 МЕ/мл, 100 МЕ/мл в 10 мл флаконе, 100 МЕ/мл в 3 мл картридже или предварительно заполненном шприце

			*включая биосимиляры
39 1	Инсулин средней продолжительности действия	Intermediate-acting insulinum	Раствор для инъекций: 40 МЕ/мл в 10 мл флаконе, 100 МЕ/мл в 10 мл флаконе, 100 МЕ/мл в 3 мл картридже или предварительно заполненном шприце
39 2	☐ Аналоги инсулина длительного действия*: Инсулин деглудек Инсулин детемир Инсулин гларгин	Long-acting insulin analogues Therapeutic alternatives: Insulin degludec Insulin detemir Insulin glargine	Раствор для инъекций: 100 МЕ/мл в 3 мл картридже или предварительно заполненном шприце *включая биосимиляры
39 3	☐ Аналоги инсулина короткого действия*: Инсулин аспарт* Инсулин лизпро* Инсулин глулизин*	Ultra-short-acting insulin analogues: Insulin aspart Insulin lispro Insulin glulisine	Раствор для инъекций: 100 МЕ/мл в 3 мл картридже или предварительно заполненном шприце *включая биосимиляры
18.5.2. Пероральные гипогликемические лекарственные средства			
39 4	☐ Эмпаглифлозин*	Empagliflozinum	Таблетки: 10 мг, 25 мг *альтернатива - канаглифлозин, дапаглифлозин
39 5	☐ Гликлазид	Gliclazidum	Твердая пероральная лекарственная форма: (таблетки с модифицируемым высвобождением 30 мг; 60 мг; 80 мг) *альтернатива - глимепирид
39 6	Глибенкламид*	Glibenclamidum	Таблетки: 5 мг *альтернатива - глимепирид глибенкламид не назначать пациентам в возрасте старше 60 лет
39 7	Метформин [с]	Metforminum	Таблетки: 500 мг, 850 мг, 1000 мг
39 8	Десмопрессин*	Desmopressinum	Таблетки: 100 мкг, 200 мкг *применяется при лечении несахарного

			диабета
18.6. Лекарственные средства для лечения гипогликемии			
39 9	Глюкагон	Glucagonum	Раствор для инъекций: 1 мг/мл
18.7. Гормоны щитовидной железы и антитиреоидные средства			
40 0	Левотироксин	Levothyroxinum natrium	Таблетки: 25 мкг [с]; 50 мкг; 100 мкг (в виде натриевой соли)
40 1	Калия йодид	Kalii iodidum	Таблетки: 100 мкг; 200 мкг; 60 мг
40 2	Пропилтиоурацил*	Propylthiouracilum	Таблетки: 50 мг *для применения, когда альтернативное лечение первой линии не подходит или недоступно; пациенткам в течение первого триместра беременности
40 3	Метимазол [с]	Methimazolum	Таблетки: 5 мг, 10 мг, 20 мг
18.8. Лекарственные средства, влияющие на гипофиз			
40 4	☐ Каберголин	Cabergolinum	Таблетки: 0,5 мг, 1 мг
40 5	Бромокриптин	Bromocriptinum	Таблетки: 2,5 мг
40 6	Октреотид	Octreotidum	Раствор для инъекций (немедленное высвобождение): 0,05 мг/мл; 0,1 мг/мл; 0,5 мг/мл (в виде ацетата) Инъекция (с модифицированным высвобождением): 20 мг (в виде ацетата) плюс разбавитель
19. Иммуноглобулины			
40 7	Туберкулин	Tuberculinum	Раствор для инъекций
40 8	Моноклональные антитела к вирусу бешенства*	Anti-rabies virus monoclonal antibodies	Раствор для инъекций: 40 МЕ/мл; 100 МЕ/мл Раствор для инъекций: 300 МЕ/мл; 600 МЕ/мл *включая биосимиляры
40 9	Противоядный иммуноглобулин*	Antivenom immunoglobulin	Раствор для инъекций
41 0	Дифтерийный антитоксин	Diphtheria antitoxinum	Раствор для инъекций: 10000 МЕ, 20000

			МЕ/мл во флаконах
41 1	Антитоксин ботулинический тип А, Е, В	Serum antitoxinum purificatum concentratum fluidum of type A, B, E	Раствор для инъекций: тип А - 10000 МЕ, Е - 10000 МЕ, В - 5000 МЕ
41 2	Иммуноглобулин человека против клещевого энцефалита	Immunoglobulin human against encephalitis ixodicum	Раствор для инъекций: 1 мл
20. Миорелаксанты			
41 3	Неостигмин	Neostigminum methylsulfas	Раствор для инъекций: 500 мкг/мл; 2,5 мг/мл (в виде метилсульфата) Таблетки: 15 мг (в виде бромида)
41 4	Суксаметоний*	Suxamethonii chloridum	Раствор для инъекций: 50 мг/мл (в виде хлорида) Порошок для инъекций: (в виде хлорида) *альтернатива - пипекурония бромид
41 5	☐ Атракурий*	Atracurium	Раствор для инъекций: 10 мг/мл (в виде безилата) *альтернатива - векуроний [с]
41 6	Пиридостигмин	Pyridostigminum	Раствор для инъекций: 1 мг/мл Таблетки: 60 мг (в виде бромида)
21. Офтальмологические лекарственные средства			
21.1. Противомикробные средства			
41 7	Ацикловир	Aciclovirum	Мазь: 3%
41 8	Азитромицин*	Azithromycinum	Глазные капли: 1,5% *трахома
41 9	Эритромицин*	Erythromycinum	Мазь: 0,5% [с] *инфекции, связанные с хламидиями или гонореей
42 0	☐ Гентамицин*	Gentamicinum	Глазные капли: 0,3% (в виде сульфата) *бактериальный блефарит, бактериальный конъюнктивит
42 1	Тобрамицин	Tobramycinum	Глазные капли

42 2	Натамицин*	Natamycinum	Глазная суспензия: 5% *грибковый кератит
42 3	☐ Офлоксацин*	Ofloxacinum	Глазные капли: 0,3% *бактериальный блефарит, бактериальный конъюнктивит
42 4	☐ Тетрациклин	Tetracyclinum	Глазная мазь: 1% *бактериальный блефарит, бактериальный конъюнктивит, бактериальный кератит, трахома
21.2. Противовоспалительные средства			
42 5	☐ Преднизолон	Prednisolonum	Глазные капли: 0,5% (в виде натрия фосфата)
21.3. Местные анестетики			
42 6	☐ Тетракаин [а]	Tetracainum	Глазные капли: 0,5% (в виде гидрохлорида) [а] не использовать у новорожденных
21.4. Миотические и противоглаукомные средства			
42 7	Ацетазоламид	Acetazolamidum	Таблетки: 250 мг
42 8	☐ Пилокарпин	Pilocarpinum	Глазные капли: 2%; 4% (в виде гидрохлорида или нитрата)
42 9	☐ Тимолол*	Timololum	Глазные капли: 0,25%; 0,5% (в виде водорода малеата) *альтернатива - другие в- адреноблокаторы с учетом доступности
43 0	Латанопрост*	Latanoprostum	Глазные капли: 50 мкг/мл *альтернатива - другие простагландины с учетом доступности
21.5. Мидриатические средства			
43 1	☐ Атропин* [а]	Atropinum	Глазные капли: 0,1%; 0,5%; 1% (в виде сульфата) *[а] не использовать у детей младше 3

			месяцев
43 2	Эпинефрин	Epinephrinum	Глазные капли: 2% (в виде гидрохлорида)
21.6. Препараты противососудистого эндотелиального фактора роста (VEGF)			
43 3	Бевацизумаб	Bevacizumabum	Раствор для инъекций: 25 мг/мл
22. Лекарственные средства для репродуктивного здоровья и перинатальной помощи			
22.1. Контрацептивы			
43 4	☐ Этинилэстрадиол + ☐ Левоноргестрел	Aethinyloestradiolum + Levonorgoestrelum	Таблетки: 30 мкг + 150 мкг *альтернатива - другие комбинированные оральные контрацептивы (КОК) с учетом доступности
43 5	☐ Этинилэстрадиол + ☐ Норэтистерон	Aethinyloestradiolum + Norethisteronum	Таблетки: 35 мкг + 1 мг *альтернатива - другие комбинированные оральные контрацептивы (КОК) с учетом доступности
43 6	Левоноргестрел	Levonorgoestrelum	Таблетки: 30 мкг; 750 мкг (упаковка из двух); 1,5 мг
43 7	Улипристал	Ulipristalum	Таблетки: 30 мг (в виде ацетата)
22.2. Инъекционные гормональные средства			
43 8	Медроксипрогестерона ацетат	Medroxyprogesteronum	Раствор для внутримышечных инъекций: 150 мг/мл Раствор для подкожных инъекций: 104 мг/0,65 мл в заполненном шприце или в одноразовой системе доставки
43 9	Норэтистерона энантат	Norethisteronum enantatum	Масляный раствор: 200 мг/мл
44 0	Эстрадиола ципионат + медроксипрогестерона ацетат	Estradiolum cypionate + Medroxyprogesteronum acetate	Раствор для инъекций: 5 мг + 25 мг
22.3. Стимуляторы овуляции			
44 1	Кломифен	Clomifenum	Таблетки: 50 мг (в виде цитрата)
44 2	☐ Летрозол*	Letrozolum	Твердая пероральная лекарственная форма: 2,5 мг *альтернатива -

			анастазол
22.4. Утеротоники			
44 3	Мизопростол*	Misoprostolum	Таблетки: 200 мкг *лечение неполного аборта и выкидыша; профилактика и лечение послеродового кровотечения, где окситоцин не доступен или не может быть безопасно применен
44 4	Окситоцин	Oxytocinum	Раствор для инъекций: 10 МЕ в 1 мл
44 5	Мифепристон - мизопростол*	Mifepristonium - misoprostolum	Таблетки: 200 мг - 200 мкг Совместная упаковка, содержащая: Таблетки мифепристона по 200 мг [1] и таблетки мизопростола по 200 мкг [4] *лечение внутриутробной гибели плода, ведение искусственного аборта
44 6	Карбетоцин	Carbetocinum	Раствор для инъекций: 100 мкг/мл
44 7	☐ Эргометрин	Ergometrinum	Раствор для инъекций: 200 мкг в 1 мл (в виде водорода малеата)
22.5. Токолитики			
44 8	Нифедипин	Nifedipinum	Капсулы немедленного высвобождения: 10 мг
22.6. Другие лекарственные средства, используемые для матери			
44 9	Дексаметазон	Dexamethasonum	Раствор для инъекций: 4 мг/мл (в виде динатрия фосфатной соли)
45 0	Транексамовая кислота	Tranexamic acidum	Раствор для инъекций: 100 мг/мл
22.7. Лекарственные средства, используемые для новорожденных			
45 1	Кофеина цитрат [с]	Coffeinum citratis	Раствор для инъекций: 20 мг/мл (эквивалентно 10 мг кофеина)/мл) Пероральный раствор:

			20 мг/мл (эквивалентно 10 мг кофеина)/мл)
45 2	Хлоргексидин [с]	Chlorhexidinum	Раствор или гель: 7,1% (в виде диглюконата), обеспечивающий 4% хлоргексидин (для ухода за пупочной раной) [с]
45 3	☐ Ибупрофен [с]	Ibuprofenum	Раствор для инъекций: 5 мг/мл
45 4	☐ Простагландин E1 [с]	Prostaglandinum E1	Раствор для инъекций: 0,5 мг/мл спиртовой
45 5	Сурфактант [с]	Surfaktantum	Суспензия для внутритрахеального введения: 25 мг/мл или 80 мг/мл
23. Раствор для перитонеального диализа			
45 6	Внутрибрюшинный раствор для диализа	Intraperitoneal solution for dialisum	Парентеральный раствор: соответствующего состава
24. Лекарственные средства при психических и поведенческих расстройствах			
24.1. Лекарственные средства для психотических расстройств			
45 7	**Флуфеназин*	Fluphenazinum	Раствор для инъекций: 25 мг (для деконоата или энантата) *альтернатива - галоперидола деканоат, зуклопентоксизола деканоат
45 8	**Галоперидол*	Haloperidolum	Раствор для инъекций: 5 мг/мл Таблетки: 1 мг, 2 мг; 5 мг *альтернатива - хлорпромазин
45 9	**Оланзапин	Olanzapinum	Порошок для инъекций: 10 мг Таблетки: 10 мг
46 0	**Рisperидон*	Risperidonum	Твердая лекарственная форма: 0,25 мг - 6 мг *альтернатива - арипипразол, оланзапин, палиперидон, кветиапин

46 1	**Клозапин	Clozapinum	Твердая пероральная лекарственная форма: 25-200 мг
24.2. Лекарственные средства для депрессивных расстройств			
46 2	**Амитриптилин	Amitriptylinum	Таблетки: 25 мг; 75 мг (в виде гидрохлорида)
46 3	☐ **Флуоксетин*	Fluoxetinum	Твердая пероральная лекарственная форма: 20 мг (в виде гидрохлорида) *альтернатива - пароксетин, сертралин, эсциталопрам, циталопрам
24.3. Лекарственные средства для биполярных расстройств			
46 4	**Карбамазепин	Carbamazepinum	Таблетки делимые: 100 мг; 200 мг, 400 мг
46 5	**Лития карбонат	Lithium carbonatum	Твердая пероральная лекарственная форма: 300 мг
46 6	☐ **Кветиапин	Quetiapinum	Таблетки немедленного высвобождения: 25 мг; 100 мг; 150 мг; 200 мг; 300 мг Таблетки (с модифицированным высвобождением): 50 мг; 150 мг; 200 мг; 300 мг; 400 мг
46 7	**Оланзапин	Olanzapinum	Таблетки: 10 мг
46 8	**Вальпроевая кислота (вальпроат натрия)	Acidum valproicum	Таблетки (с кишечнорастворимой оболочкой): 200 мг; 500 мг (в виде вальпроата натрия)
24.4. Лекарственные средства для тревожных расстройств			
46 9	☐ **Диазепам*	Diazepamum	Таблетки делимые: 2 мг; 5 мг *использовать только в коротком периоде для лечения острого или тяжелого тревожного расстройства
47 0	☐ **Флуоксетин*	Fluoxetinum	Твердая пероральная лекарственная форма: 20 мг (в виде

			гидрохлорида) *альтернатива - пароксетин, сертралин, эсциталопрам, циталопрам
24.5. Лекарственные средства для обсессивно-компульсивных расстройств			
47 1	**Кломипрамин	Clomipraminum	Капсулы: 10 мг, 25 мг (в виде гидрохлорида)
47 2	☐ **Флуоксетин	Fluoxetinum	Твердая пероральная лекарственная форма: 20 мг (в виде гидрохлорида) *альтернатива - пароксетин, сертралин, эсциталопрам, циталопрам
47 3	**Гидроксизин	Hydroxyzine	Таблетки: 25 мг
47 4	**Алпразолам	Alprazolam	Таблетки: 1 мг
47 5	**Клоназепам	Clonazepam	Таблетки: 0,5 мг; 2 мг
47 6	**Галоперидол	Haloperidolum	Раствор для инъекций: 5 мг/мл Масляный раствор для инъекций: 50 мг/мл (в виде деканата) Таблетки: 1 мг, 2 мг; 5 мг
47 7	**Клозапин	Clozapinum	Твердая пероральная лекарственная форма: 25-200 мг
24.6. Лекарственные средства, применяемые при расстройствах из-за употребления психоактивных веществ			
24.6.1. Лекарственные средства, применяемые при алкогольной зависимости			
47 8	Акампросат кальция	Acamprosatum calcium	Таблетки: 333 мг
47 9	Налтрексон*	Naltrexonum	Суспензия для инъекций: 380 мг Твердые лекарственные формы: 50 мг *альтернатива - дисульфирам
24.6.2. Лекарственные средства, применяемые при никотиновой зависимости			
48	Бупропион ±	Bupropionum	Таблетки: 150 мг (в

0			виде гидрохлорида)
48 1	Варениклин ±	Vareniclinum	Таблетки: 0,5 мг, 1 мг
24.6.3. Лекарственные средства, применяемые при опиоидной зависимости			
48 2	☐ ***Метадон	Methadonum	Концентрат для перорального раствора: 5 мг/мл, 10 мг/мл (в виде гидрохлорида) Пероральный раствор: 5 мг/мл, 10 мг/мл (в виде гидрохлорида)
48 3	***Бупренорфин	Buprenorphinum	Раствор для инъекций: 0,3 мг/мл (в виде гидрохлорида) Таблетки: 2 мг, 8 мг (в виде гидрохлорида)
48 4	Налтрексон	Naltrexonum	Суспензия для инъекций: 380 мг Капсулы (в форме гидрохлорида): 50 мг Таблетки (в форме гидрохлорида): 50 мг
25. Лекарственные средства, действующие на дыхательные пути			
25.1. Лекарственные средства, применяемые при бронхиальной астме и хронической обструктивной болезни легких			
48 5	☐ Будесонид*	Budesonidum	Аэрозоль для ингаляций: 100 мкг/доза, 200 мкг/доза
48 6	Беклометазон	Beclomethasonum	Аэрозоль для ингаляций: 50 мкг/доза; 100 мкг/доза (в виде дипропионата)
48 7	Флутиказон	Fluticasonum	Аэрозоль для ингаляций: 50 мкг/доза, 125 мкг/доза, 250 мкг/доза (в виде пропионата)
48 8	Эпинефрин	Epinephrinum	Раствор для инъекций: 1 мг/мл (в виде гидрохлорида или водорода тартрата)
48 9	Ипратропия бромид*	Ipratropii bromidum	Аэрозоль для ингаляций: 20 мкг/доза *альтернатива - тиотропий
49 0	☐ Сальбутамол	Salbutamolum	Аэрозоль для ингаляций: 100 мкг/доза (в виде

			сульфата) Раствор для инъекций: 50 мкг/мл в 5 мл ампуле (в виде сульфата) Дозированный аэрозоль: 100 мкг/доза (в виде сульфата) Раствор для ингаляций с помощью аэрозольных ингаляторов: 5 мг/мл (в виде сульфата)
49 1	☐ Будесонид + ☐ Формотерол	Budesonidum + Formoterolum	Порошок для ингаляций: 100 мкг + 6 мкг/доза, 200 мкг + 6 мкг/доза
49 2	Беклометазон + Формотерол	Beclometasonum + Formoterolum	Аэрозоль для ингаляций: 100 мкг + 6 мкг/доза
49 3	Флутиказон + Формотерол	Fluticasonum + Formoterolum	Аэрозоль для ингаляций: 12 мкг + 250 мкг/доза
49 4	Сальметерол + Флутиказон	Salmeterolum+ Fluticasonum	Аэрозоль для ингаляций: 25 мкг + 50 мкг, 25 мкг + 125 мкг; 25 мкг + 250 мкг
26. Растворы, корректирующие водные, электролитные растворы и кислотно-щелочные нарушения			
26.1. Пероральные растворы			
49 5	Пероральные регидратационные соли		
26.2. Парентеральные растворы			
49 6	Глюкоза	Glucosum	Раствор для инъекций: 5% (изотонический); 10% (гипертонический); 40% (гипертонический)
49 7	Глюкоза с натрия хлоридом	Glucosum with sodium chloridum	Раствор для инъекций: 4% глюкозы, 0,18% натрия хлорида (эквивалентен Na⁺ 30 ммоль/л, Cl⁻ 30 ммоль/л) Раствор для инъекций: 5% глюкоза, 0,9% хлорида натрия (эквивалентен Na⁺ 150 ммоль/л и Cl⁻ 150 ммоль/л); 5% глюкозы, 0,45% хлорида натрия

			(эквивалентен Na^+ 75 ммоль/л и Cl^- 75 ммоль/л) [с]
49 8	Соли калия	Potassium salts	Раствор для инъекций
49 9	Натрия хлорид	Sodium chloridum	Раствор для инъекций: 0,9% изотонический (эквивалентен Na^+ 154 ммоль/л, Cl^- 154 ммоль/л)
50 0	Натрия гидрокарбонат	Sodium hydrogen carbonatum	Раствор для инъекций: 1,4% изотонический (эквивалентен Na^+ 167 ммоль/л, HCO_3^- 167 ммоль/л) Раствор: 8,4% в 10 мл ампуле (эквивалентен Na^+ 1000 ммоль/л, HCO_3^- 1000 ммоль/л)
26.3. Разные			
50 1	Вода для инъекций	Aqua for injection	Раствор для инъекций
27. Витамины и минералы			
50 2	Аскорбиновая кислота	Ascorbic acidum	Таблетки: 50 мг
50 3	Кальций	Calcium	Таблетки: 500 мг
50 4	☐ Эргокальциферол	Ergocalciferolum	Пероральный раствор: 250 мкг/мл (10000 МЕ/мл) Твердая пероральная лекарственная форма: 1,25 мг (50000 МЕ)
50 5	☐ Холекальциферол* [с]	Cholecalciferolum	Пероральный раствор: 400 МЕ/мл Твердая пероральная лекарственная форма: 400 МЕ, 1000 МЕ *альтернатива - эргокальциферол
50 6	Йод	Iodinum	Капсулы: 190 мг Йодированное масло: 1 мл (480 мг йода), 0,5 мл (240 мг йода) в ампулах (пероральный или инъекционный), 0,57 мл (308 мг йода) в диспенсерных бутылках
50	Пиридоксин	Pyridoxinum	Таблетки: 25 мг, 50 мг

7			(в виде гидрохлорида)
508	Ретинол	Retinolum	Капсулы: 50000 МЕ; 100000 МЕ; 200000 МЕ (в виде пальмитата) Пероральный масляный раствор: 100000 МЕ/мл (в виде пальмитата) в многодозовом дозаторе Таблетки (с сахарным покрытием): 10000 МЕ (в виде пальмитата) Водорастворимый раствор: 100000 МЕ (в виде пальмитата)
509	Рибофлавин	Riboflavinum	Таблетки: 5 мг
510	Тиамин	Thiaminum	Таблетки: 50 мг (в виде гидрохлорида)
511	Кальция глюконат	Calcium gluconatis	Раствор для инъекций: 100 мг/мл
512	Никотинамид	Nicotinamidum	Таблетки: 50 мг
28. Лекарственные средства для болезней уха, горла и носа			
513	☐ Будесонид [с]	Budesonidum	Назальный спрей: 100 мкг/доза
514	☐ Ципрофлоксацин [с]	Ciprofloxacinum	Капли ушные: 0,3% (в виде гидрохлорида)
515	☐ Ксилометазолин [а] [с]	Xylomethazolinum	Назальный спрей: 0,05% [а] не использовать у детей младше 3-х месяцев
29. Лекарственные средства для лечения заболеваний суставов			
29.1. Лекарственные средства, применяемые для лечения подагры			
516	Аллопуринол	Allopurinolum	Таблетки: 100 мг
29.2. Болезнь - модифицирующие агенты, применяемые при ревматических расстройствах (DMARDs)			
517	Хлорохин	Chloroquinum	Таблетки: 100 мг; 150 мг (в виде фосфата или сульфата)
518	Азатиоприн	Azathioprinum	Таблетки: 50 мг
519	Метотрексат	Methotrexatum	Таблетки: 2,5 мг (в виде натриевой соли)
520	Сульфасалазин	Sulfasalazinum	Таблетки: 500 мг

52 1	Пеницилламин	Penicillaminum	Твердая пероральная лекарственная форма: 250 мг
52 2	Гидроксихлорохин	Hydroxychloroquinum	Твердая пероральная лекарственная форма: 200 мг (в виде сульфата)
29.3. Лекарственные средства, применяемые при ювенильных заболеваниях суставов			
52 3	Ацетилсалициловая кислота*	Acetylsalicylic acidum	Суппозитории: 50 мг до 150 мг Таблетки: 100 мг до 500 мг *для применения при ревматической атаке, ювенильном артрите, болезни Кавасаки
52 4	Адалимумаб* ±	Adalimumabum	Раствор для инъекций: 10 мг/0,2 мл [с], 20 мг/0,4 мл [с], 40 мг/0,8 мл, 40 мг, 0,4 мл *альтернативы - цертолизумаб, этанерсепт, инфликсимаб, голимумаб
52 5	Метотрексат	Methotrexatum	Таблетки: 2,5 мг (в виде натрия)
52 6	Триамцинолона гексацетонид	Triamcinolonum hexacetonide	Раствор для инъекций: 20 мг/мл
52 7	Тоцилизумаб ±	Tocilizumabum	Концентрат для приготовления раствора: 80 мг/4 мл, 200 мг/10 мл

Перечень дезинфицирующих средств для инфекционного контроля

1. Дезинфицирующие средства			
1	Средство на спиртовой основе для обработки рук	Alcohol based hand rub	Раствор, содержащий этанол 80% объем/объем, содержащий изопропиловый спирт 75% объем/объем раствора
2	Соединение на основе хлора	Chlorine base compound	Жидкость: (0,1% доступного хлора) для раствора Порошок: (0,1% доступного хлора) для раствора Твердое вещество: (0,1% доступного хлора) для раствора
3	Хлороксиленол	Chloroxylenolum	Раствор: 4,8%
4	Глутарал	Glutaralum	Раствор: 2%

Перечень вакцин согласно Национальному календарю прививок

№	Вакцины		
1	Вакцина для профилактики кори, паротита и краснухи	Morbilli, combinations with parotitis and rubella, live attenuated vaccine	Лиофилизированный порошок 2-, 5- и 10-дозные с растворителем
2	Вакцина против кори и краснухи	Morbilli, combinations with rubella vaccine	Лиофилизированный порошок для инъекций, 5- и 10-дозные во флаконе в комплекте с растворителем
3	Вакцина против краснухи	Rubella vaccine	Лиофилизированный порошок для инъекций 5- и 10-дозные во флаконе в комплекте с растворителем
4	Вакцина для профилактики кори	Morbilli, live attenuated vaccine	Порошок лиофилизированный для инъекций 5- и 10-дозные, в комплекте с растворителем
5	Вакцина для профилактики эпидемического паротита	Parotitis vaccine	Лиофилизированный порошок для инъекций 5- и 10-дозные во флаконе в комплекте с растворителем
6	Вакцина для профилактики гемофильной инфекции	Haemophilus influenzae B vaccine	Порошок для инъекций 10 мкг/доза в комплекте с растворителем
7	Вакцина против гепатита В	Hepatitis B vaccine	Раствор для инъекций 1-, 6-, 10-дозные во флаконе
8	БЦЖ-вакцина активная специфическая вакцина для профилактики туберкулеза	BCG-vaccine	Лиофилизированный порошок для инъекций 20-дозные во флаконе в комплекте с растворителем
9	Инактивированная полиовакцина трехкомпонентная	Inactive poliomyelitis vaccine types 1, 2 and 3	Для инъекций 0,5/1 доза: 1-, 5- и 10-дозные
10	Бивалентная оральная вакцина от полиомиелита от 1 и 3 типа	Bivalent oral vaccine of poliomyelitis types 1 and 3	Суспензия для приема внутрь, 10- и 20-дозные
11	Моновалентная оральная вакцина от полиомиелита	Monovalent oral vaccine of poliomyelitis	Суспензия для приема внутрь, 10- и 20-дозные
12	Новая оральная полиомиелитная вакцина типа 2 (нОПВ2)	New oral polio vaccine type 2 (nOPV2)	Суспензия для приема внутрь, 50-дозные
13	АКДС-вакцина адсорбированная коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина	Adsorbed Diphtheriae pertussis - tetanus vaccine	Раствор для инъекций 10- и 20-дозные во флаконах
14	Пентавалентная комбинированная вакцина (АКДС+ВГВ+ХИБ)	Pentavalent combination vaccine (DTP+Hib+HBV)	Раствор для инъекций 1- и 10-дозные во флаконе
15	АДС-вакцина	Adsorbed Diphtheriae et tetanus vaccine	Раствор для инъекций 10- и 20-дозные в ампуле
16	АДС-М вакцина	Adsorbed Diphtheriae et tetanus vaccine (for adults)	Раствор для инъекций 10- и 20-дозные в ампуле
17	Пневмококковая 13-	Pneumococcal 13-valent	Для инъекций 0,5/1 доза; 1- и 5-

	валентная конъюгированная вакцина ПКВ	conjugate vaccine	дозные
18	Пневмококковая 10- валентная конъюгированная вакцина ПКВ	Pneumococcal 10-valent conjugate vaccine	Для инъекций 0,5/1 доза; 1- и 5- дозные
19	Ротавирусная вакцина жидкая оральная	Rotavirus	Пероральный раствор 1-доза/2,5 мл, 2-дозные во флаконе
20	Вакцина против вируса папилломы человека квадривалентная рекомбинантная	Vaccine against human papillomavirus quadrivalent recombinant	Суспензия для инъекций 0,5 мл/1 доза
21	Менингококковая вакцина	Meningococcus polysaccharide vaccine	Раствор для инъекций 1-, 5-, 10-, 50-дозные

Приложение 2

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ жизненно важных медицинских изделий

№	Наименование вида медицинского изделия
1	Аппарат для измерения артериального давления
2	Глюкометры и расходные материалы
3	Контрацептивы (внутриматочные средства, презервативы, диафрагмы вагинальные, имплантируемые контрацептивы, внутривагинальные контрацептивы)
4	Концентратор кислорода
5	Медицинские изделия для новорожденных
6	Медицинские изделия: катетер, жгут, воздуховод, шпатель, зонд, стилет, коннектор, скальпель, лезвия, скарификатор, мочеприемник, маска, мешок, иглы, подушка кислородная, Мешок Амбу и др.
7	Медицинские инструменты
8	Наборы для инвазивных вмешательств (наборы, катетеры, канюли, дренажи, трубки и др.)
9	Наборы для переливания крови, раствора и др.
10	Наборы для диагностики in vitro (клинических, биохимических, иммунологических, бактериологических, молекулярно-генетических, тест-системы, экспресс тест-системы, реактивы и др.), лабораторная посуда и принадлежности
11	Нити хирургические с иглой и без иглы
12	Перевязочный материал (вата, бинты, марля, салфетки, гипсовые бинты, гипс, лейкопластырь и др.)
13	Перчатки смотровые и хирургические
14	Расходные материалы для проведения гемодиализа и перитониального диализа
15	Расходные материалы и приспособления для проведения эндоскопических вмешательств
16	Питательные среды, диски для определения чувствительности к антибиотикам
17	Расходные материалы для проведения инструментальных вмешательств (рентгеновские пленки, термопленки и др.)

18	Система для энтерального питания
19	Система доставки лекарственных средств в дыхательные пути (небулайзеры, ингаляторы и др.)
20	Сосудистые протезы, стенты, окклюдеры, интродьюсеры, кава-фильтр, оксигенаторы, временный/постоянный, протезы сердечного клапана и др.
21	Средства для иммобилизации и транспортировки
22	Средство гемостатическое
23	Термометр электронный
24	Тонометр офтальмологический
25	Трубки интубационные, трахеостомические, эндотрахеальные и др.
26	Устройства для исследований глаз, ЛОР-органов и др.
27	Фонендоскоп, стетоскоп
28	Шприц общего назначения, шприц ангиографический, шприц инсулиновый, шприц туберкулиновый, шприцы с манометром, шприц-колба, шприц Жанэ и др.
29	Щитки и очки защитные всех видов для медицинских целей
30	Электрокардиостимуляторы